

# AXPAIN METHYL SALICYLATE CREAM/GEL

Methyl Salicylate/ Menthol (25% w/w/ 5% w/w, 10% w/w/ 4% w/w)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel.
2. Bagaimana Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel.
4. Cara menggunakan Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel.
5. Semasa menggunakan Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel.
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

## Apakah kegunaan Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel

Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel digunakan untuk melegakan kesakitan ringan dan kesakitan pada otot (eg: sakit belakang) dan sendi yang berkaitan dengan ketegangan, lebam dan terseliuh.

## Bagaimana Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel berfungsi

Methyl Salicylate digunakan untuk mengurangkan kesakitan dan keradangan.

Apabila Menthol disapu pada kulit, salur darah akan membesar menyebabkan satu sensasi kesejukan diikuti oleh satu kesan analgesia. Ia juga bertindak sebagai penambahan penembusan ubat apabila digunakan pada kulit, memberi tindakan permulaan yang lebih cepat.

## Sebelum menggunakan Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel

### -Bila tidak boleh digunakan

Jangan guna Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel jika:

- Anda alergi atau hipersensitif pada kandungan produk ini.
- Ia tidak dipreskripsi oleh doktor atau ahli farmasi bertauliah kepada anda.
- Anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

- Anda sedang menyusukan anak. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk nasihat sebelum mengambil sebarang ubat.

### -Sebelum menggunakan Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel

Maklumkan kepada doktor anda jika:

- Anda hamil atau menyusukan bayi.
- Anda alergi pada ubat-ubatan.
- Anda mengambil ubatan lain (termasuk yang tidak dipreskripsi oleh doktor anda).

### -Jika mengambil ubat-ubatan lain

Anda perlu memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat-ubatan berikut kerana ia mungkin berinteraksi dengan Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel anda:

- Warfarin.

Ia mungkin masih selamat bagi anda untuk mengambil Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel dan doktor akan menentukan apa yang sesuai untuk anda.

## Cara menggunakan Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel

### -Berapa banyak harus digunakan

Bagi sakit otot dan sakit belakang: susuatu kuantiti krim/gel yang kecil 2-3 kali sehari. Urut secara perlahan-lahan pada kawasan yang dijangkiti sehingga krim/gel diserap ke dalam kulit sepenuhnya.

### -Bila perlu digunakan

Doktor anda akan menentukan bila anda perlu mengambil Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel megikut keadaan anda.

### -Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

### -Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil

dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

### -Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

- Simptom-simptom seperti pening, tinitus (tanggapan bunyi bising dalam telinga), pekak, berpeluh, loya, muntah, sakit kepala dan kekeliruan. Simptom-simptom ini boleh dikawal dengan mengurangkan dos penggunaan krim ini.
- Anda perlu menghubungi doktor anda dengan segera jika anda mengambil Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel berlebihan.

## Semasa menggunakan Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel

### -Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel.
- Beritahu kepada doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

### -Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

### -Perkara yang perlu diberi perhatian

- Tidak digalakkkan guna pada bayi.
- Jangan diguna pada kawasan luka atau kulit yang rosak.
- Elakkan terkena pada mata dan membran mukus.
- Berhenti mengguna jika kerengsaan berlebihan berlaku pada kulit.

# AXPAIN METHYL SALICYLATE CREAM/GEL

Methyl Salicylate/ Menthol (25% w/w/ 5% w/w, 10% w/w/ 4% w/w)

## Kesan-sesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya. Anda adalah dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor/ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Kesan-sesan sampingan berikut telah dilaporkan:

- Kerengsaan sederhana pada kulit jika mengguna berterusan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) (*Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

## Penyimpanan dan pelupusan Axpain Methyl Salicylate Cream

### -Penyimpanan

Jauhkan Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel daripada jangkauan kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

### -Pelupusan

Jangan guna Axpain Methyl Salicylate Cream/Gel yang melebihi tarikh luput yang dicetak pada kotak.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

## Maklumat lanjut

### -Rupa dan warna produk

Axpain Methyl Salicylate Cream: Krim berwarna putih, larut dalam air dan mempunyai bau mentol.

Axpain Methyl Salicylate Gel:

Krim berwarna putih, dan mempunyai sensasi penyejukan.

## -Bahan-bahan kandungan

### - Bahan Aktif:

Axpain Methyl Salicylate Cream:  
Methyl Salicylate and Menthol.

Axpain Methyl Salicylate Gel:  
Methyl Salicylate and Menthol  
Crystal

### - Bahan Tidak Aktif:

Axpain Methyl Salicylate Cream:  
Methyl Paraben, Propyl Paraben,  
Liquid Paraffin, Popylene Glycol, I-Hexadecanol, I-Octadecanol, Peg-20  
Stearate and Purified Water.

Axpain Methyl Salicylate Gel:  
Benzalkonium Chloride, Ethyl  
Alcohol, Isopropyl Alcohol,  
Glycerin, Maleic Anhydride,  
Sodium Hydroxide, Hydrochloride  
Acid 35% dan Purified Water.

## -Nombor MAL

Axpain Methyl Salicylate Cream:  
MAL08111823X

Axpain Methyl Salicylate Gel:  
MAL09011453X

## Pengilang dan pemegang pendaftaran produk

Kotra Pharma (M) Sdn Bhd  
No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12,  
Cheng Industrial Estate,  
75250 Melaka, Malaysia.

## Tarikh kemaskini RiMUP

06/03/2018

## Nombor siri

NPRA(R4/1)270318/00084