

FEXOFIN®-120**FEXOFIN®-180**

Tablet Fexofenadine

- Apakah kegunaan FEXOFIN®
- Bagaimana FEXOFIN® berfungsi
- Sebelum mengambil FEXOFIN®
- Cara mengambil FEXOFIN®
- Semasa mengambil FEXOFIN®
- Kesan sampingan FEXOFIN®
- Penyimpanan dan pembuangan FEXOFIN®
- Deskripsi Produk

Apakah kegunaan FEXOFIN®

FEXOFIN® digunakan untuk melegakan gejala kronik idiopatik kulit gatal dan alahan radang hidung seperti gejala bersin, discaj mukus yang berlebihan, gatal pada hidung/lelangit/tekak & mata merah berair.

Bagaimana FEXOFIN® berfungsi

FEXOFIN® (Fexofenadine HCl) adalah generasi ketiga H₁- antihistamin jenis bukan pelali. Fexofenadine adalah metabolit farmakologi aktif terfenadine.

Sebelum anda mengambil FEXOFIN®

Bila anda tidak boleh mengambilnya

FEXOFIN® tidak harus diambil oleh pesakit yang mempunyai alahan terhadap sebarang kandunganya.

Sebelum anda mula mengambilnya

Anda harus ketahui fakta yang berikut:

Pesakit dengan masalah buah pinggang atau hati harus mengambil Fexofenadine HCl dibawah pengawasan doktor.

Kesan terhadap keupayaan memandu atau mengendalikan mesin:

Fexofenadine tidak mungkin mempunyai kesan terhadap keupayaan memandu atau mengendalikan mesin. Walaubagaimanapun, adalah dinasihatkan untuk mengenalpasti respon individu sebelum memandu atau mengendalikan mesin.

Penggunaan semasa mengandung dan Penyusuan:

Fexofenadine HCl hanya boleh digunakan dalam kehamilan jika potensi kebaikan mewajarkan potensi risiko kepada janin.

Pengambilan Ubat Lain

Jangan mengambil bersama erythromycin atau ketoconazole.

Adalah dinasihatkan untuk selang dua jam di antara pengambilan Fexofenadine HCl dan aluminium- dan magnesium hydroxide yang mengandungi antasid.

Cara Mengambil FEXOFIN®

Berapa banyak harus diambil

Alahan radang hidung : Dewasa (berumur 12 tahun dan lebih) – Satu tablet 120 mg satu kali sehari.

Kronic Idiopati kulit gatal: Dewasa (berumur 12 tahun dan lebih) – Satu tablet 180 mg satu kali sehari.

Golongan Risiko Khas – Dos Fexofenadine HCl tidak semestinya perlu diselaraskan pada warga emas atau pesakit dengan masalah buah pinggang dan hati.

Bila masa untuk mengambil

FEXOFIN® harus diambil sebelum makan. Jangan ambil bersama dengan jus buah-buahan.

Berapa lama harus diambil

Ikut nasihat doktor.

Jika anda terlupa untuk mengambilnya

Jika anda telah terlupa untuk mengambil satu dos, anda perlu mengambil dos yang terlupa serta merta, melainkan ia hampir masa untuk dos yang seterusnya. Dalam kes ini tinggalkan dos yang anda lupa dan teruskan dengan jadual seperti biasa.

Dos yang terlupa tidak perlu di betulkan dengan mengambil dos yang lebih besar.

Jika anda mengambil terlalu banyak (terlebih dos)

Tidak ada sebarang laporan kes terlebih dos dengan Fexofenadine. Walaubagaimanapun, dalam keadaan terlebih dos, hubungi doktor anda dengan segera dan ikuti nasihat doktor.

Semasa anda menggunakan FEXOFIN®

Perkara yang anda harus lakukan

Habiskan keseluruhan rawatan yang diberi seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Perkara yang anda harus beri perhatian

Jangan mengambil FEXOFIN® bersama dengan erythromycin, ketoconazole, aluminium dan magnesium yang mengandungi antasid.

Kesan Sampingan

Sakit kepala, mengantuk, loya, pening, letih mungkin berlaku.

Selepas menggunakan FEXOFIN®

Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak!

Simpan di tempat yang dingin, kering pada suhu bawah 25°C.

Pembuangan

Ubat anda tidak harus dilupuskan melaui sisa air atau sisa isian rumah. Tanya pada farmasi anda cara untuk melupuskan ubatan yang tidak diperlukan lagi.

Deskripsi Produk

Apakah rupabentuk

FEXOFIN®-120 Tablet – Berwarna putih, berbentuk oblong, tablet bersalut filem.

FEXOFIN®-180 Tablet – Berwarna jingga, berbentuk oblong, tablet bersalut filemts.

Kandungan

Setiap tablet **FEXOFIN®-120** mengandungi 120 mg Fexofenadine HCl

Setiap tablet **FEXOFIN®-180** mengandungi 180 mg Fexofenadine HCl

MAL No.:

FEXOFIN®-120: MAL07101249AC

FEXOFIN®-180: MAL08042451AC

Pengilang

Micro Labs Limited, 92 Sipcot, Hosur, India.

Pemegang pendaftaran

Apex pharmacy marketing Sdn Bhd (Selangor, Malaysia)

Tarikh Kemaskini

March 2012

