

HYDRORAZIDE 50 TABLET

Hydrochlorothiazide 50mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hydrorazide 50 Tablet
2. Bagaimana Hydrorazide 50 Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Hydrorazide 50 Tablet
4. Cara menggunakan Hydrorazide 50 Tablet
5. Semasa menggunakan Hydrorazide 50 Tablet
6. Kesan-sesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hydrorazide 50 Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Hydrorazide 50 Tablet

Hydrorazide 50 Tablet mengandungi bahan aktif Hydrochlorothiazide. Hydrochlorothiazide digunakan untuk merawat edema dan tekanan darah tinggi.

Bagaimana Hydrorazide 50 Tablet berfungsi

Hydrochlorothiazide tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai diuretik thiazide. Hydrochlorothiazide mengurangkan penyerapan semula elektrolit seperti natrium dan kloride dari tubul-tubul ginjal anda. Ini menyebabkan pengeluaran air kencing meningkat dan membawa kepada menurunkan tekanan darah anda.

Sebelum mengambil Hydrorazide 50 Tablet

Bila tidak boleh mengambil:

- Jika anda alah (hipersensitif) kepada hydrochlorothiazide.
- Jika anda mengandung atau sedang menyusu.

Sebelum mula mengambil:

Sila beritahu doktor anda jika anda mengalami mana-mana keadaan/penyakit yang berikut:

- Penyakit ginjal
- Kerosakkan fungsi hati atau penyakit hati progresif.
- *Systemic lupus Erythematosus*- penyakit di mana sistem imun badan menyerang badan.

- Ketidakseimbangan cecair dan elektrolit, hiponatrimia (kepekatan ion natrium lebih rendah dalam serum), hipokalemia alkalosis (lebih rendah) kepekatan ion kalium dalam darah) dan hypomagnesaemia (lebih rendah kepekatan ion magnesium dalam darah).
- Gout
- Diabetis

Jika mengambil ubat-ubat lain:

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan, ini termasuk ubat yang diperolehi tanpa preskripsi. Doktor anda mungkin perlu menukar dos ubat-ubat anda yang lain atau mengambil langkah berjaga-jaga yang lain. Dalam setengah kes, anda mungkin perlu menghentikan pengambilan salah satu ubat. Ini terutamanya kepada ubat-ubat yang disenaraikan di bawah yang diambil bersama-sama dengan hydrochlorothiazide:

- Ubat yang mengandungi Lithium: Secara umumnya tidak boleh diberikan dengan diuretic. Agen diuretic mengurangkan penyingiran litium dari buah pinggang.
- Alkohol, barbiturates atau narkotik berpotensi untuk menyebabkan orthostatic hypotension (tekanan darah rendah apabila berdiri tegak).
- Ubat antidiabetik (ubat oral atau insulin): perlarasan dos ubat antidiabetik mungkin diperlukan.
- Ubat antihipertensi lain: Kesan tambahan atau potensi.
- Cholestyramine dan Colestipol Resins.
- Corticosteroids, ACTH: menerukkan kesan pengurangan elektrolit, terutamanya hypokalemia.
- *Pressor Amina* (contohnya norepinephrine): Kemungkinan mengurangkan tindak balas kepada pressor amina tetapi tidak mencukupi untuk menghalang penggunaannya.
- Penenang otot rangka, nondepolarizing (contohnya Tubocurarine): Kemungkinan untuk

meningkatkan kesan ubat penenang otot ini.

- Ubat anti-radang bukan steroid: Dalam sesetengah pesakit yang mengambil agen anti-radang nonsteroidal serentak, pesakit harus diperhatikan dengan teliti untuk menentukan sama ada kesan daripada diuretik yang diingini telah diperolehi.

Cara menggunakan Hydrorazide 50 Tablet

Berapa banyak harus digunakan

Dewasa:

Untuk edema:

25-100mg setiap hari dalam satu dos atau dos yang dibahagikan.

Untuk darah tinggi:

25mg setiap hari dalam satu dos. Boleh ditinggatkan kepada 50mg setiap hari dan diberikan sebagai dos tunggal atau dibahagikan.

Kanak-kanak:

Dos biasa adalah berdasarkan kepada 1mg/kg/hari dalam 2 dos.

1-2 tahun: 12.5-37.5mg setiap hari dalam 2 dos.

2-12 tahun: 37.5-100mg setiap hari dalam 2 dos.

Dos dalam kedua-dua kumpulan umur hendaklah berdasarkan kepada berat badan. Walau bagaimanapun, pesakit pediatrik dengan tekanan darah tinggi jarang akan mendapat manfaat daripada dos yang lebih besar daripada 50mg setiap hari.

Bila perlu digunakan

Selalu ambil tablet seperti yang diberitahu oleh doktor anda. Dos tersebut akan dipamerkan pada label ubat. Periksa label ubat dengan teliti. Ianya dinyatakan berapa banyak tablet yang anda perlu mengambil dan berapa kerap. Jika anda tidak pasti, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

Sentiasa ambil ubat anda seberapa lama yang anda telah diberitahu kecuali anda mengalami sebarang masalah. Untuk kes ini, periksa dengan doktor anda.

HYDRORAZIDE 50 TABLET

Hydrochlorothiazide 50mg

- **Jika terlupa menggunakan**

Jika anda terlupa mengambil satu dos, jangan risau. Ambil dos tersebut sebaik sahaja anda mengingatnya dan teruskan seperti biasa. Jika anda tidak mengambil tablet anda untuk satu hari, ambil dos biasa anda pada hari seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang telah dilupa.

- **Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)**

Jika anda tidak sengaja mengambil dos yang berlebihan, hubungi doktor atau ahli farmasi anda, atau hospital yang berdekatan dengan segera.

Semasa menggunakan Hydrorazide 50 Tablet

- **Perkara yang perlu dilakukan**

- Simpan RiMUP ini di tempat yang selamat. Anda mungkin ingin membacanya lagi.
- Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau keraguan, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- **Perkara yang tidak boleh dilakukan**

- Ubat ini dipreskripsi untuk anda. Jangan bagi ubat ini kepada orang lain. Ia mungkin membahayakan mereka, walaupun simptom-simptom yang mereka alami adalah sama dengan anda.

- **Perkara yang perlu diberi perhatian**

- Jika anda rasa pening, lelah ataupun mengantuk selepas mengambil Hydrorazide 50 Tablet, jangan memandu kereta atau mengendalikan mesin.

Kesan-kesan sampingan

- Sistem Gastrostus- Hilang selera makan, sakit gastrik, loya, muntah, kekejangan, cirit-birit, sembelit, penyakit kuning, radang pancreas dan radang kelenjar air liur.
- Sistem Saraf Pusat- Pening, *vertigo*, sakit kepala, penglihatan kuning dan sensasi kesemutan, menggeletek,cucukan, tusukan atau terbakar.
- Hematologi: Penurunan dalam bilangan sel-sel darah putih

(leukopenia), merendahkan kiraan sel darah putih (agranulocytosis), penurunan relatif platelet dalam darah (thrombocytopenia) dan anemia.

- Kardiovaskular: Tekanan darah rendah apabila berdiri tegak (*hypotension orthostatic*).
- Hipersensitiviti: Kemunculan kelunturan warna merah atau ungu pada kulit (purpura), ruam fotosensitivity, gatal-gatal (*urticaria*), tindak balas keradangan saluran darah menyebabkan nekrosis fibrinoid tisu, terutamanya dinding saluran darah (*necrotising angiitis*), demam, kesusahan pernafasan termasuk pneumonitis, dan tindak balas alahan yang cepat.
- Lain-lain: Kepekatan glukosa yang tinggi luar biasa dalam darah (hiperglisemia), perkumuhan karbohidrat dalam air kencing (*glycosuria*), paras asid urea yang tinggi luar biasa dalam darah (*hyperuricaemia*), kekejangan otot, lemah, kegelisahan dan penglihatan kabur.

Dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor/ahli farmasi anda untuk maklumat lanjut.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau tindak balas alahan terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel.:03-78835550 atau laman [web portal.bpfk.gov.my](http://web.portal.bpfk.gov.my) (*Consumer → Reporting*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Hydrorazide 50 Tablet

- **Penyimpanan**

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

- **Pelupusan:**

Jangan makan ubat itu apabila telah lulus tarikh luputnya. Pulang tablet yang belum digunakan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan. Hanya simpan tablet jika doktor anda menasihatkannya. Jangan buang ubat tersebut di dalam air atau bersama-sama dengan sampah-sarap rumah. Tindakan ini boleh

membantu melindungi alam persekitaran.

Maklumat Lanjut

- **Rupa dan warna produk:**

Tablet berwarna oren-merah jambu, bulat, muka rata, tepi serong dengan diameter kira-kira 7.9mm dan garis di sebelah tablet.

- **Bahan-bahan**

- **Bahan aktif:**
Hydrochlorothiazide

- **Bahan-bahan tidak aktif:**

Corn starch, Aerosil 200, Povidone K29-K32, Ponceau 4R, Lactose, Magnesium Stearate dan Sunset Yellow.

- **No. Pendaftaran**

MAL19870193A

Pengilang

Royce Pharma Manufacturing Sdn.Bhd.

PT 1663, Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk Royce Pharma Manufacturing Sdn.Bhd.

PT 1663, Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

21/04/2014