

NEVANAC Ophthalmic Suspension

Nepafenac 0.1% w/v

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Nevanac
2. Bagaimana Nevanac berfungsi
3. Sebelum menggunakan Nevanac
4. Cara menggunakan Nevanac
5. Semasa menggunakan Nevanac
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Nevanac
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Nevanac

Nevanac digunakan untuk merawat kesakitan dan keradangan yang berkaitan dengan pembedahan katarak. Mengurangkan risiko selepas makula operasi edema (bengkak pada makula, bahagian tengah retina yang terletak di bahagian belakang mata) yang berkaitan dengan pembedahan katarak pada pesakit kencing manis.

Bagaimana Nevanac berfungsi

Nevanac mengurangkan kesakitan dan keradangan yang berkaitan dengan pembedahan katarak.

Sebelum menggunakan Nevanac

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan ubat ini sekiranya anda mempunyai alahan (hypersensitif) terhadap Nevanac atau kandungan yang lain dalam produk ini atau alahan kepada *non-steroidal anti-inflammatory drugs* (NSAIDs).

- Sebelum menggunakan Nevanac

Sila beritahu doktor anda jika anda mengalami keadaan berikut:

1. gangguan mata;
2. kencing manis;
3. arthritis reumatoïd;
4. pembedahan mata;
5. mata kering;

6. kecenderungan untuk pendarahan;
7. jangkitan mata.

Sila dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan Nevanac jika anda mengandung atau merancang untuk mengandung, menyusukan anak atau merancang untuk menyusukan anak. Doktor anda akan pertimbangkan risiko yang anda hadapi apabila mengambil tablet Nevanac terhadap manfaat yang anda akan perolehi.

Sekiranya anda memakai kanta sentuh, sila tanggalkan sebelum menggunakan Nevanac. Anda juga tidak digalakkan memakai kanta sentuh dalam tempoh rawatan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat apabila diambil dengan Nevanac boleh mengganggu fungsi diantara satu sama lain. Ini termasuk: steroid topikal.

Cara menggunakan Nevanac

- Berapa banyak harus digunakan

Dos yang disyorkan adalah 1 titisan dalam mata yang terlibat setiap 3 kali sehari mulai sehari sebelum pembedahan katarak dan pada hari pembedahan dan teruskan selama 2 minggu pertama tempoh selepas pembedahan.

Untuk mengurangkan risiko edema makular selepas pembedahan yang berkaitan dengan pembedahan katarak pada pesakit kencing manis, dos disyorkan adalah 1 titisan Nevanac dalam kantung konjunktiva mata yang terjejas setiap 3 kali sehari awal 1 hari sebelum pembedahan katarak, teruskan sehingga pada hari

pembedahan dan sehingga 60 hari selepas pembedahan seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Doc tambahan perlu diberikan 30 hingga 120 minit sebelum pembedahan.

Bila perlu digunakan

Ikat arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk mengantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Nevanac

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Nevanac.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- <u><i>Perkara yang tidak boleh dilakukan</i></u> Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda. Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda. Jangan berkongsi Nevanac dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.	<u>Gangguan mata</u> Tidak lazim: keradangan kornea, kemerahan mata, mata berair, sensitif terhadap cahaya, pelepasan mata, alahan konjunktivitis, penglihatan kabur, mata kering, sakit mata, mata pruritus, lacrimation meningkat, margin kelopak mata kerak, terasa benda asing didalam mata. Jarang berlaku: Keradangan iris, konjunktivitis, deposit kornea, gangguan kornea, fotofobia, keradangan kelopak mata, pengaliran & pembentukan cecair dalam mata, kemerahan konjunktiva, kerengsaan mata, gangguan kelopak mata, ketidakselesaan mata. Tidak diketahui: ulser keratitis, lelasan kornea, kelegapan kornea, penyembuhan (kornea) terjejas, ketajaman penglihatan kekurangan, mata Bengkok.	Cara penyimpanan dan pelupusan Nevanac - <u><i>Penyimpanan</i></u> Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Simpan pada suhu 2°C hingga 25°C. - <u><i>Pelupusan</i></u> Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.
- <u><i>Perkara yang perlu diberi perhatian</i></u> Sila berjaga-jaga sekiranya anda mempunyai atau pernah mempunyai kecenderungan untuk pendarahan atau menerima ubat-ubatan lain yang boleh meningkatkan risiko pendarahan. Penggunaan kedua-dua NSAID dan ubat titis mata steroid boleh mengganggu proses penyembuhan. Elakkan penggunaan kedua-dua ubat ini.	 <u>Gangguan Gastrostous</u> Jarang berlaku: loya, mulut kering	Maklumat lanjut - <u><i>Rupa dan warna produk</i></u> Nevanac adalah dalam bentuk cecair steril yang berwarna kuning muda atau kuning.
Penggunaan NSAID topikal boleh menyebabkan keradangan kornea. Sila rujuk doktor anda jika anda mengalami tanda-tanda dan gejala keradangan kornea semasa menggunakan Nevanac. Berhati-hati ketika memandu kenderaan atau mengendalikan mesin sehingga anda mengetahui kesan Nevanac terhadap anda.	<u>Gangguan Kulit dan tisu subkutaneus</u> Jarang berlaku: dermatitis alergi	- <u><i>Bahan-bahan kandungan</i></u> <u>Bahan aktif</u> Nepafenac
Kesan-kesan sampingan Seperti ubat-ubatan lain, Nevanac boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Berikut adalah kesan-kesan sampingan yang boleh dialami oleh pesakit:	<u>Siasatan</u> Tidak diketahui: Tekanan Darah Jika salah satu daripada kesan-kesan sampingan yang mungkin berlaku tersebut di atas, anda perlu menghentikan rawatan dan berunding dengan doktor anda. Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda mendapatkan apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.	<u>Bahan tidak aktif</u> Mannitol, carbomer 974P, sodium chloride, tyloxapol, edetate disodium, benzalkonium chloride 0.005% (preservative), sodium hydroxide and/or hydrochloric acid and purified water, USP.
<u>Gangguan Sistem Imun:</u> Jarang berlaku: hipersensitiviti	Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (<i>Consumers → Reporting</i>)	- <u><i>MAL number:</i></u> MAL20081732A
<u>Gangguan Sistem Saraf</u> Tidak lazim: sakit kepala		Pemegang Pendaftaran Produk Alcon Laboratories (M) Sdn Bhd 9 th Floor, Wisma Glomac 3, Kompleks Kelana Centre Point, Jalan SS7/19, 47301, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
		Tarikh kemaskini RiMUP 20/07/2015
		Nomborsiri: BPFK(R4/1)200715/00216