

NEXIUM MUPS TABLET

Esomeprazole (20mg, 40mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Nexium MUPS
2. Bagaimana Nexium MUPS berfungsi
3. Sebelum mengambil Nexium MUPS
4. Cara menggunakan Nexium MUPS
5. Semasa menggunakan Nexium MUPS
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara menyimpan dan pelupusan Nexium MUPS
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Nexium MUPS

Nexium MUPS digunakan untuk merawat dan menghalang keadaan-keadaan berikut kembali:

Orang dewasa dan remaja berumur 12 tahun dan ke atas

- Penyakit refluks Gastro-oesophageal (GERD), iaitu keadaan di mana asid dari perut terlepas ke dalam esofagus (tub yang menghubungkan tekak dan perut) lalu menyebabkan kesakitan, keradangan dan pedih ulu hati.
- Ulser dalam perut atau bahagian atas usus yang dijangkiti dengan bakteria yang dipanggil *Helicobacter pylori*. Jika anda mengalami keadaan ini, doktor juga mungkin menetapkan antibiotik untuk merawat jangkitan dan menyembuh ulser.

Orang dewasa

- Ulser perut yang disebabkan oleh ubat-ubatan yang dikenali sebagai NSAID (Ubat anti-radang bukan steroid). Nexium MUPS juga boleh digunakan untuk menghalang pembentukan ulser perut semasa anda mengambil NSAID.
- Terlalu banyak asid dalam perut yang disebabkan oleh pertumbuhan dalam pankreas (sindrom Zollinger-Ellison).

- Rawatan berpanjangan selepas pencegahan pendarahan semula ulser dengan suntikan Nexium..

Bagaimana Nexium MUPS berfungsi

Nexium MUPS mengandungi ubat yang dipanggil esomeprazole. Ia tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil 'perencat pam proton'. Ubat ini mengurangkan jumlah asid yang dihasilkan oleh perut.

Sebelum mengambil Nexium MUPS - Bila tidak boleh mengambil

- Anda alah (hipersensitif) kepada esomeprazole atau sebarang bahan lain ubat ini.
- Anda alah kepada perencat pam proton lain (contohnya pantoprazole, lanzoprazole, rabeprazole, omeprazole).
- Anda mengambil ubat yang mengandungi nelfinavir (digunakan untuk merawat HIV).

Jika anda tidak pasti, bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Nexium MUPS.

- Sebelum mengambil Nexium MUPS

Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Nexium MUPS jika anda mempunyai:

- masalah hati yang teruk.
- masalah buah pinggang yang teruk.

Nexium MUPS boleh menyembunyikan gejala-gejala penyakit lain. Oleh itu, jika sebarang keadaan yang berikut berlaku kepada anda sebelum anda mula atau semasa mengambil Nexium MUPS, berhubung dengan doktor anda dengan segera:

- Kehilangan berat badan yang banyak tanpa sebab dan mengalami masalah menelan.
- Sakit perut atau senak.
- Muntah makanan atau darah.
- Najis anda hitam (najis berlumuran darah).

Rawatan dengan perencat pam proton boleh mengakibatkan peningkatan risiko jangkitan perut dan usus.

Jika anda telah ditetapkan Nexium MUPS "atas permintaan", anda perlu menghubungi doktor jika simptom anda berterusan atau berubah.

Nexium MUPS belum dikenal pasti menyebabkan keretakan tulang. Sila maklumkan doktor anda jika anda diberitahu anda mempunyai *osteoporosis* (penyakit tulang rapuh).

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru ini mula mengambil, sebarang ubat lain. Ini termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi. Ini disebabkan Nexium MUPS boleh menjelaskan kesan ubat lain dan ubat lain boleh menjelaskan kesan Nexium MUPS.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat yang berikut:

- Atazanavir (untuk merawat HIV).
- Clopidogrel (untuk mengelakkan pembekuan darah).
- Ketoconazole , Itraconazole atau voriconazole (untuk rawatan jangkitan kulat).
- Citalopram , Imipramine atau clomipramine (untuk merawat kemurungan).
- Diazepam (untuk merawat keresahan, mengendurkan otot atau sawan) .
- phenytoin (rawatan sawan). Jika anda mengambil phenytoin, doktor perlu memantau anda apabila anda mula atau berhenti mengambil Nexium MUPS.
- Ubat yang digunakan untuk mencairkan darah, seperti warfarin. Doktor mungkin perlu memantau anda apabila anda mula atau berhenti mengambil Nexium MUPS.
- Cilostazol (untuk merawat klaudikasi intermiten - kesakitan pada kaki apabila anda berjalan

yang disebabkan oleh bekalan darah yang tidak mencukupi).

- Cisapride (untuk senak dan pedih ulu hati).
- Methotrexate (ubat kemoterapi yang digunakan dalam dos yang tinggi untuk merawat kanser) - jika anda mengambil dos methotrexate yang tinggi, doktor mungkin menghentikan rawatan Nexium MUPS anda buat sementara waktu.
- Tacrolimus (pemindahan organ).
- Digoxin (untuk masalah jantung).
- rifampicin (untuk rawatan batuk kering).
- Wort St John (Hypericum perforatum) (untuk merawat kemurungan).

Jika doktor menetapkan antibiotik amoxicillin dan clarithromycin serta Nexium MUPS untuk merawat ulser disebabkan oleh jangkitan *Helicobacter pylori*, adalah sangat penting anda memberitahu doktor mengenai ubat-ubat lain yang anda ambil.

Cara menggunakan Nexium MUPS

- Berapa banyak harus digunakan

Dos yang biasa adalah seperti di bawah.

Dewasa dan remaja berumur 12 tahun atau ke atas:

Rawatan erosive reflux esophagus inflammation dan menghalang penyakit tersebut kembali:

Dos biasa adalah satu tablet Nexium MUPS 40 mg sekali sehari selama 4 minggu. Doktor boleh memberitahu anda untuk mengambil dos yang sama untuk 4 minggu seterusnya jika esofagus anda masih belum sembuh. Setelah esofagus sembuh, dos yang biasa adalah satu tablet Nexium MUPS 20 mg sekali sehari.

Rawatan pedih ulu hati disebabkan oleh penyakit refluks gastro-oesophageal (GERD)

Jika esofagus anda tidak mengalami keradangan, dos biasa adalah satu tablet Nexium MUPS 20 mg setiap hari. Apabila penyakit telah dikawal, doktor boleh memberitahu anda untuk mengambil ubat apabila perlu sahaja,

satu tablet Nexium MUPS 20 mg setiap hari. Jika anda mempunyai masalah hati yang teruk, doktor boleh memberikan anda dos yang lebih rendah.

Rawatan ulser disebabkan oleh jangkitan Helicobacter pylori dan untuk menghalang jangkitan kembali:

Dewasa: Dos yang biasa adalah satu tablet Nexium MUPS 20 mg dua kali sehari selama seminggu. Doktor juga akan memberitahu anda untuk mengambil dengan antibiotik, sebagai contoh amoxicillin dan clarithromycin

Rawatan ulser perut yang disebabkan oleh NSAID:

Dewasa: Dos biasa adalah satu tablet Nexium MUPS 20 mg sekali sehari selama 4 hingga 8 minggu.

Untuk mencegah ulser perut jika anda mengambil NSAID:

Dewasa: Dos biasa adalah satu tablet Nexium MUPS 20 mg sekali sehari.

Rawatan terlalu banyak asid dalam perut yang disebabkan oleh pertumbuhan dalam pankreas (Sindrom Zollinger - Ellison):

Dewasa: Dos yang biasa adalah Nexium MUPS 40 mg dua kali sehari. Doktor akan menyesuaikan dos mengikut keperluan anda dan juga akan menentukan berapa lama anda perlu mengambil ubat. Dos yang maksimum ialah 160 mg dua kali sehari.

Rawatan yang berpanjangan selepas pencegahan pendarahan semula ulser dengan suntikan Nexium:

Dos yang biasa adalah satu tablet Nexium MUPS 40 mg sekali sehari selama 4 minggu.

Nexium MUPS tablet tidak digalakkkan untuk kanak-kanak berumur kurang daripada 12 tahun

- Bila perlu mengambil

Anda boleh mengambil tablet anda pada bila-bila masa.

Anda boleh mengambil pil anda dengan makanan atau dengan perut

kosong. Telan seluruh tablet dengan segelas air. Jangan kunyah atau hancurkan tablet. Ini disebabkan tablet mengandungi pelet bersalut yang mengelakkan ubat daripada dihancurkan oleh asid di dalam perut anda. Adalah penting untuk tidak merosakkan pelet.

Jika anda mempunyai masalah menelan pil:

- Masukkan pil ke dalam segelas (tanpa gas) air. Jangan gunakan sebarang cecair yang lain.
- Kacau sehingga tablet berpecah (larutan menjadi keruh). Kemudian minum campuran dengan segera atau dalam masa 30 minit. Kacau campuran sebelum minum.
- Untuk memastikan bahawa anda telah minum semua ubat, bilas gelas dengan baik dengan setengah gelas air dan minum.

Jika anda langsung tidak boleh menelan, tablet boleh dicampurkan dengan air tanpa gas dan dimasukkan ke dalam picagari. Kemudian, campuran boleh dialirkan melalui tiub terus ke dalam perut anda ('tiub gastrik').

- Berapa lama perlu digunakan

Sentiasa ambil Nexium MUPS seperti mana yang dipesan oleh doktor. Sila semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Jika anda mengambil ubat ini untuk masa yang lama, doktor akan memantau anda (terutamanya jika ubat diambil untuk lebih daripada setahun). Jika doktor memberitahu anda untuk mengambil ubat apabila perlu sahaja, beritahu doktor jika terdapat perubahan simptom.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil satu dos, ambil sebaik sahaja anda ingat. Jika sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal. Jangan gandakan dos anda untuk menggantikan dos tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika mengambil berlebihan dos, sila berhubung dengan doktor atau ahli farmasi anda dengan segera. Simptom-simptom berkaitan dengan pengambilan berlebihan dos adalah masalah usus dan perut dan kelemahan.

Semasa menggunakan Nexium MUPS

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat setiap hari seperti mana yang ditetapkan.
Jika doktor menetapkan antibiotik bersama-sama Nexium MUPS, pastikan anda menghabiskan kesemua ubat seperti yang dipesan

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat lain bersama dengan Nexium MUPS tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda terlebih dahulu.

- Perkara yang perlu diberi perhatian Mengandung dan menyusu

Sebelum mengambil Nexium MUPS, beritahu doktor jika anda sedang mengandung atau cuba untuk hamil. Doktor akan menentukan sama ada anda boleh mengambil Nexium MUPS pada masa ini.

Tidak diketahui sama ada Nexium MUPS boleh dirembeskan ke dalam susu ibu. Oleh itu, anda tidak boleh mengambil Nexium MUPS jika anda sedang menyusu.

Memandu dan menggunakan mesin
Nexium MUPS tidak akan menjelaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin.

Nexium MUPS tablet mengandungi sukrosa, yang merupakan sejenis gula. Jika anda telah diberitahu oleh doktor bahawa anda intoleransi kepada beberapa gula, bincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Kesan-sesan Sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Nexium MUPS boleh menyebabkan kesan sampingan. Namun bukan semua

orang akan mengalaminya. Jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan serius yang berikut, berhenti mengambil Nexium MUPS dan hubungi doktor dengan segera:

- Tiba-tiba berasa semput, Bengkak pada bibir, lidah dan tekak atau badan, ruam, pengsan atau kesukaran menelan (reaksi alahan yang teruk).

Kesan-sesan ini jarang berlaku, yang melibatkan kurang daripada 1 dalam 1,000 orang.

Kesan sampingan yang lain termasuk:
Biasa (kurang daripada 1 dalam 10 orang)

- Sakit kepala.
- Kesan pada perut atau usus: cirit-birit, sakit perut, sembelit, angin. loya) atau muntah

Tidak biasa (kurang daripada 1 dalam 100 orang)

- Bengkak pada kaki dan buku lali.
- Susah tidur (insomnia)
- Pening, perasaan mencucuk, rasa mengantuk.
- perasaan berputar (vertigo)
- mulut kering.
- Perubahan dalam ujian darah yang memeriksa fungsi hati.
- Ruam kulit, geligata dan kulit gatal.

Jarang (kurang daripada 1 dalam 1,000 orang)

- masalah darah seperti sel-sel darah putih atau platelet berkurang. Ini boleh menyebabkan senang mendapat lebam atau jangkitan.
- Tahap natrium rendah dalam darah. Ini boleh menyebabkan muntah dan kekejangan.
- Rasa gelisah, keliru atau tertekan.
- Perubahan rasa
- penglihatan kabur.
- Tiba-tiba sesak nafas
- Keradangan dalam mulut
- Jangkitan yang dikenali sebagai ‘sariawan’ yang boleh menjelaskan usus akibat daripada kulat.
- Keguguran rambut

- Tindak balas kulit terhadap cahaya matahari meningkat.
- sakit sendi atau sakit otot
- Secara umumnya berasa tidak sihat dan kekurangan tenaga.
- Lebih banyak peluh.
- Keradangan hati, termasuk penyakit kuning yang boleh menyebabkan kulit kuning, air kencing gelap, dan keletihan.

Sangat jarang berlaku (kurang daripada 1 dalam 10,000 orang)

- Agresif
- Melihat, rasa atau mendengar perkara-perkara yang tidak wujud (halusinasi).
- masalah hati yang teruk yang menyebabkan kegagalan hati dan menjelaskan otak.
- Ruam teruk atau melepuh atau pengelupasan kulit secara tiba-tiba. Ini boleh dikaitkan dengan demam yang tinggi dan sakit sendi (eritema multiforme, sindrom Stevens- Johnson, nekrolisis epidermal toksik)
- kelemahan otot.
- masalah buah pinggang yang teruk.
- dada membesar di kalangan lelaki.
- Jika anda mengambil Nexium MUPS, paras magnesium dalam darah anda mungkin berkurang. Tanda-tanda paras magnesium rendah adalah keletihan, pengecutan otot tidak terkawal, disorientasi, sawan, atau peningkatan kadar denyutan jantung. Tahap magnesium yang rendah juga boleh mengurangkan tahap kalium atau kalsium dalam darah. Jika anda menghadapi simptom ini, sila beritahu doktor anda dengan segera.
- Keradangan dalam usus (yang menyebabkan cirit-birit).

Nexium MUPS sangat jarang boleh menjelaskan sel-sel darah putih yang menyebabkan kekurangan imun. Jika anda mempunyai jangkitan dengan simptom seperti demam dengan keadaan menjadi teruk secara umumnya atau demam dengan simptom jangkitan tempatan seperti

sakit di leher, tekak atau mulut atau kesukaran membuang air kecil, anda perlu berjumpa dengan doktor anda dengan segera.

Jika sebarang kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda mendapat kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers → Reporting*).

Cara menyimpan dan pelupusan Nexium MUPS

- Penyimpanan

Jauhkan daripada jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Jangan simpan di atas suhu 30°C.

Simpan ubat ini di dalam bekas asal (blister).

Jangan ambil pil anda selepas tarikh tamat tempoh (EXP) yang tertera di atas kotak atau kerajang lepuh. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

- Pelupusan

Pulangkan ubat yang tidak digunakan kepada ahli farmasi.

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa air atau bahan buangan isi rumah.

Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa & warna produk

Nexium MUPS 20 mg tablet berwarna merah jambu, berbentuk bujur, biconvex, bersalut filem dengan A/EH di satu sisi dan 20 mg di sisi lain.

Nexium MUPS 40 mg tablet tablet berwarna merah jambu, , berbentuk bujur, biconvex, bersalut filem dengan A/EI di satu sisi dan 40 mg di sisi lain.

Saiz pek:

14 tablet pada dua papan lepuh berisi 7 tablet setiap satu.

- Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif:

Esomeprazole magnesium trihydrate.

-Bahan tidak aktif:

Glyceryl monostearate 40-55, hydrolose, hypromellose, iron oxide (reddish-brown, yellow) (E172, 20 mg tablet only), magnesium stearate, methacrylic acid ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 per cent, microcrystalline cellulose, synthetic paraffin, macrogol, polysorbate 80, crospovidone, sodium stearyl fumarate, sugar spheres (sucrose and maize starch), talc, titanium dioxide (E171), triethyl citrate.

- Nombor MAL

20mg: MAL20020238AR

40mg: MAL20020239AR

Pengilang

AstraZeneca AB

15185 Södertälje, Sweden.

Pemegang Pendaftaran Produk

AstraZeneca Sdn. Bhd.

Level 12, Surian Tower,

1 Jalan PJU 7/3,

Mutiara Damansara,

47810 Petaling Jaya,

Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP:

13/10/2015

GI.000-204-616.4.0

(based on PI: GI.000-029-001.17.0)

Nombor siri:

BPFK(R4/1)090915/00310