

REGRO LOTION

Minoxidil (3% and 5%)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan REGRO
2. Bagaimana REGRO berfungsi
3. Sebelum menggunakan REGRO
4. Cara menggunakan REGRO
5. Semasa menggunakan REGRO
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan REGRO
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan REGRO

Ia digunakan secara topical untuk rawatan corak kebotakan lelaki bagi kedua-dua lelaki dan perempuan.

Bagaimana REGRO berfungsi

Minoxidil, bahan aktif dalam REGRO, merangsang pertumbuhan rambut dan melambatkan kadar perkembangan botak dengan membantu aliran darah ke sel-sel kulit kepala yang tumbuh rambut.

Sebelum menggunakan REGRO

- Bila tidak boleh menggunakan
Anda tidak boleh menggunakan REGRO jika anda:
 - a. mempunyai sejarah tindakbalas alahan kepada alkohol minoxidil, dan *Propylene glycol*.
 - b. mengandung atau menyusu.
 - c. di bawah umur 18 tahun atau lebih 65 tahun.
 - d. mengalami keguguran rambut dengan tiba-tiba atau tidak dapat dijelaskan.
 - e. kulit kepala anda adalah merah, radang, dijangkiti atau menyakitkan. Elakkan dari terkena mata anda.
 - f. Jangan sapu pada bahagian-bahagian badan selain daripada kulit kepala. Produk

ini adalah untuk kegunaan luaran sahaja.

- g. Jangan gunakan alat pengering rambut untuk kering larutan REGRO pada kepala atau hisap rokok semasa memohon REGRO.
 - h. Jangan menyedut kabus semburan.
 - i. Jangan guna pada masa yang sama dengan persediaan topikal lain pada kawasan kulit kepala yang sama. Semburan rambut dan produk rambut biasa boleh digunakan selepas REGRO telah digunakan.
 - j. tidak mempunyai sejarah kehilangan rambut dalam keluarga.
- Sebelum menggunakan REGRO
Tanya doktor atau ahli farmasi
 - a. jika anda sedang menggunakan, baru selesai atau baru mula menggunakan ubat yang lain.
 - b. jika anda mempunyai masalah jantung atau sedang mengambil ubat untuk merawat tekanan darah tinggi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Penggunaan REGRO dengan ubat untuk menurunkan tekanan darah tertentu seperti *guanethidine* boleh menyebabkan penurunan tekanan darah apabila berdiri. Rawatan anda dengan Regro mungkin tidak berkesan jika anda mengambil *diethylcarbamazine* atau *paracetamol* dengan kerap.

Cara menggunakan REGRO

- Berapa banyak harus diambil Dewasa (18 hingga 65 tahun): Sembur satu dos (7 semburan atau 1ml) REGRO pada kawasan botak atau keguguran rambut, dua kali sehari. Dos ini harus digunakan tanpa mengira saiz kawasan botak. Jangan melebihi dua dos (14 semburan atau 2ml) setiap hari. Urut kulit kepala

perlahan-lahan dengan hujung jari selepas setiap semburan. Basuh tangan selepas guna.

Kaedah penggunaan adalah seperti berikut:

1. Bagi kawasan besar kepala, gunakan pam semburan. Tujukan dan tekan pam ke kawasan pusat botak. Sebarkan perlahan-lahan dengan hujung jari untuk menutup semua kawasan botak.
2. Bagi kawasan kecil atau kawasan-kawasan di bawah rambut, gunakan hujung aplikator. Tarik kepala pam penyembur keluar dan pasangkan hujung aplikator ke atas batang semburan. Tujukan dan tekan pam ke arah pusat kawasan botak. Sebarkan perlahan-lahan dengan hujung jari untuk menutup semua kawasan botak.
- Bila perlu diambil
Dua kali sehari, sebaik-baiknya pada pagi dan malam.
- Berapa lama perlu diambil
Keberkesanan minoxidil hanya boleh dijangka selepas penggunaan berterusan selama 4 bulan atau lebih pada kawasan berkenaan. Permulaan dan tahap rangsangan pertumbuhan rambut berbeza di antara individu. Rawatan berterusan dengan REGRO diperlukan untuk menjaga rambut baru dan juga menghentikan kehilangan rambut tambahan. Selepas menghentikan rawatan, proses botak akan bermula sekali lagi. Adalah penting untuk anda memahami bahawa REGRO tidak bekerja dengan baik dalam semua orang, dan bagaimana ia berfungsi bergantung kepada beberapa perkara. Anda perlu berbincang apa hasil yang anda jangkakan dari rawatan dengan ahli farmasi atau doktor anda. Jika anda bertindak balas kepada rawatan dengan REGRO, pertumbuhan semula

REGRO LOTION

Minoxidil (3% and 5%)

pada mulanya mungkin lembut, rambut halus seperti bulu, dan tidak boleh dilihat. Selepas rawatan lanjut, kemungkinan besar pertumbuhan semula rambut anda akan berubah dan menjadi warna yang sama dan tebal sebagai seluruh rambut anda.

Jika selepas 6 bulan menggunakan REGRO, tiada pertumbuhan rambut dilihat, anda perlu berbincang dengan ahli farmasi atau doktor anda tentang menghentikan rawatan kerana sebarang pertumbuhan daripada rawatan berterusan mungkin kecil.

Jangan ubah dos REGRO anda atau berhenti menggunakan REGRO tanpa meminta nasihat daripada ahli farmasi atau doktor terlebih dahulu.

- Jika terlupa mengambil
Jika anda terlupa untuk menggunakan REGRO dan sudah tiba masanya untuk menggunakan dos seterusnya, abaikan dos yang anda telah terlepas dan kembali ke jadual biasa anda. Jangan gunakan lebih daripada 1ml setiap aplikasi. Jangan gunakan lebih daripada dua kali sehari untuk menggantikan dos yang anda terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sila hubungi doktor dengan segera.

Semasa menggunakan REGRO

- Perkara yang perlu dilakukan

Pastikan kulit kepala dan rambut kering sepenuhnya. Gunakan hanya pada kulit yang sihat dan kukuh.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mencuci rambut atau basah kulit kepala sekurang-kurangnya 4 jam selepas aplikasi. Ia adalah dinasihatkan supaya berhenti menggunakan REGRO selama 24 jam sebelum

membuat rawatan rambut lain seperti pewarnaan atau pengeringan rambut.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Jika REGRO tidak sengaja terkena pada mata, membran mukus atau kulit terkikis, kawasan itu perlu dibilas dengan banyak air sejuk.

Jika tidak sengaja tertelan, terus pergi ke hospital terdekat anda dengan produk tersebut. Sebahagian daripada tandatanda dan gejala yang mungkin berlaku adalah kadar jantung yang cepat, tekanan darah rendah, bengkak atau keadaan bengkak pada badan. Pengekalan air boleh diuruskan dengan terapi diuretik yang sesuai dan *tachycardia* boleh dikawal oleh pengambilan agen *beta-adrenergic agonist*.

Kesan-sesan sampingan

Semua ubat mempunyai kesan sampingan tetapi anda mungkin tidak akan mengalaminya. Kesan-sesan sampingan termasuk kulit bersisik, kulit kering, *erythema* / kemerahan, dermatitis, sensasi kebakaran dan ruam. Jika anda tidak berasa sihat apabila menggunakan REGRO, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers Reporting*).

Cara penyimpanan dan pelupusan REGRO

- Penyimpanan
Simpan di bawah 25°C dan jauh daripada haba, percikan api dan nyalaan terbuka. Jauhkan dari kanak-kanak.

- Pelupusan
Jangan gunakan apabila telah lepas tarikh luputnya.
Jangan buang ubat tersebut di dalam air atau bersama-sama dengan sampah-sarap rumah. Tindakan ini boleh membantu melindungi alam persekitaran.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
REGRO adalah larutan yang jernih dan tidak berwarna.

- Bahan-bahan kandungan
Ramuan aktif
Regro Lotion :
Minoxidil 3% w/v
Regro 5% Lotion :
Minoxidil 5% w/v

Bahan-bahan tidak aktif
REGRO LOTION
Propylene glycol, Chloroform spirit, Citric acid Monohydrate, Sodium Citrate Dihydrate, Purified water

REGRO 5% LOTION
Propylene glycol, Chloroform spirit, Purified water

- Nombor MAL
REGRO LOTION:
MAL19930377A
REGRO 5% LOTION:
MAL20000038A

Pengilang

Drug Houses of Australia Pte. Ltd.,

#09-01/02 Haw Par Tiger Balm Building
No.2 Chia Ping Road,
Singapore 619968.

Pemegang Pendaftaran Produk

Actavis Sdn Bhd
(formerly known as Ascent Pharmahealth Malaysia Sdn Bhd)

Unit 304, Level 3, Uptown 2, 2 Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

22-08-2013