

SUNGLUCON TABLET

Glipizide 5 mg

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah Kegunaan Sunglucon Tablet.
2. Bagaimana Sunglucon Tablet berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Sunglucon Tablet.
4. Cara menggunakan Sunglucon Tablet.
5. Semasa pengambilan Sunglucon Tablet.
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara Penyimpanan & Pelupusan.
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang, Dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah Kegunaan Sunglucon Tablet

Sunglucon Tablet digunakan untuk rawatan diabetes mellitus / kencing manis yang tidak bergantung kepada insulin.

Bagaimana Sunglucon Tablet Berfungsi

Glipizide tergolong dalam kumpulan 'sulphonylurea'. Ia merangsang penghasilan insulin oleh sel beta kelenjar pankreas.

Sebelum Mengambil Sunglucon Tablet

Bila tidak boleh mengambil

- Jika anda alergi kepada Glipizide atau bahan-bahan lain yang terkandung di dalam produk ini.
- Jika anda menghadapi penyakit kencing manis yang bergantung kepada insulin.
- Jika anda mengalami diabetik ketoasidosis.
- Jika anda mengalami koma and precoma diabetes.
- Jika anda menghadapi penyakit buah pinggang.
- Jika anda menghadapi masalah hati
- Jika anda mengalami trauma yang teruk atau jangkitan.
- Jika anda mengandung atau menyusu

Sebelum mula mengambil

Dapatkan nasihat doktor jika anda:-

- Mengandung/ Disyaki mengandung.
- Merancang untuk mengandung.
- Akan menjalani pembedahan
- Menghidapi penyakit buah pinggang

Jika mengambil ubat-ubat lain

Terdapat beberapa jenis ubat yang tidak digalakkan diambil bersama dengan Benil Tablet. Anda harus memaklumkan doktor dan ahli farmasi anda mengenai ubat yang sedang diambil termasuk ubat yang dibeli di farmasi tanpa preskripsi doktor. Maklumkan doktor dan ahli farmasi jika anda sedang mengambil ubat – ubatan berikut :-

- Penyekat-beta
- Antibiotik
- Adrenaline
- Thiazide atau lain-lain diuretik
- Estrogen/pil cegah hamil
- Ubat tahan sakit
- Antikoagulan
- Produk hormone tiroid
- Kortikosteroid

Cara menggunakan Sunglucon Tablet

Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. Jangan ambil lebih atau kurang daripada amaun yang disyorkan.

Dos permulaan bagi pesakit dewasa adalah 5mg sehari, dinaikkan secara beransur-ansur sehingga dos maksima 40 mg sehari jika perlu.

Dos yang melebihi 15 mg mestilah dibahagikan kepada beberapa dos dalam sehari.

Bila perlu digunakan

Sunglucon Tablet perlu diambil sejeurus sebelum makan.

Berapa lama perlu digunakan

Ikut arahan yang telah ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Jika terlupa menggunakan

Jangan gandakan dos anda. Ambil dos seperti biasa bila tiba waktu untuk dos seterusnya.

Jika mengambil berlebihan(terlebih dos)

Hubungi doktor anda atau dapatkan bantuan kecemasan.

Semasa menggunakan Sunglucon Tablet

Perkara yang perlu dilakukan

Ambil Sunglucon Tablet mengikut arahan doktor.

Perkara yang tidak perlu dilakukan

Jangan kongsi ubat anda dengan orang lain walaupun mereka mengalami masalah yang sama.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan yang dinyatakan.

Kesan-kesan Sampingan

Kesan sampingan yang biasa ialah gangguan gastrousus dan hipoglisemia.

Simptom-simptom hipoglisemia termasuk berpeluh, kelaparan dan lemah badan. Jika teruk, kekeliruan dan koma.

Kesan sampingan yang jarang berlaku ialah ruam.

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan-kesan lain semasa pengambilan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No.Tel : 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers Reporting*)

Cara penyimpanan and pelupusan Benil Tablet

Penyimpanan

Simpan pada suhu dibawah 25°C .

Pelupusan

Jangan buang ubat-ubatan yang berlebihan secara sebarangan. Dapatkan nasihat ahli farmasi anda mengenai cara-cara pelupusan ubatan.

SUNGLUCON TABLET

Glipizide 5 mg

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Maklumat Lanjut

Rupa dan warna produk

Bujur, rata, berwarna biru cair dengan skor pada satu permukaan.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Glipizide
- Bahan tidak aktif
Magnesium stearate, corn starch, laktosa, microcrystalline cellulose, Lake blue.

Nombor Pendaftaran Produk

MAL20021134A

Pengilang

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
9,11 &17, Jalan Kempas 4,
Taman Perindustrian Tampoi Indah,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
9,11 &17, Jalan Kempas 4,
Taman Perindustrian Tampoi Indah,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

25/8/2014