

FLEMING TABLET

Amoxicillin + Potassium Clavulanate (625mg, 1g)

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Fleming tablet
2. Bagaimana Fleming tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Fleming tablet
4. Cara menggunakan Fleming tablet
5. Semasa menggunakan Fleming tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Fleming tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Fleming tablet

Fleming tablet digunakan untuk merawat pelbagai jenis jangkitan dalam badan yang disebabkan oleh bakteria. Jangkitan boleh menjelaskan dada (bronkitis atau radang paru-paru), pundi kencing (cystitis), sinus (resdung), telinga (otitis media), kulit, tulang dan sendi, jangkitan gigi dan jangkitan rahim.

Bagaimana Fleming tablet berfungsi

Fleming tablet adalah antibiotik dan berfungsi membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan. Ia mengandungi dua jenis ubat yang berbeza dipanggil amoxicillin dan clavulanic acid. Amoxicillin tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai "penisilin" yang kadang-kadang boleh berhenti daripada berfungsi (tidak aktif). Komponen aktif lain (clavulanic acid) menghalang ini daripada berlaku.

Sebelum menggunakan Fleming tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Fleming tablet jika anda alah (hipersensitif) kepada amoxicillin, clavulanic acid, penisilin, atau mana-mana bahan-bahan lain Fleming tablet.

Jika anda pernah mempunyai tindak balas alergi (hipersensitif) yang teruk kepada apa-apa antibiotik lain seperti Cephalosporin. Ini termasuk ruam kulit atau bengkak pada muka atau leher.

Jika anda pernah mempunyai masalah hati atau jaundis (kekuningan kulit) apabila mengambil antibiotik.

Jika anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil Fleming tablet.

Mengandung

Jangan ambil Fleming tablet jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung, melainkan jika diarahkan oleh doktor anda.

- Selbelum menggunakan Fleming tablet

Semak dengan doktor, ahli farmasi atau jururawat sebelum menggunakan Fleming tablet jika anda:

- ada demam kelenjar
- sedang dirawat untuk masalah hati atau buah pinggang

Jika anda tidak pasti mana-mana di atas berkenaan dengan anda, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan terapi ubat antikoagulan, kontraseptif oral (pil kawalan kelahiran), probenecid (untuk merawat penyakit gout dan batu karang), allopurinol (ubat sintetik untuk merawat gout), warfarin (untuk mengelakkan pembekuan darah dalam urat) atau sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Fleming tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa mengambil ubat ini betul-betul seperti diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Doktor anda mungkin memberi anda dos yang lebih rendah jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati.

- Bila perlu digunakan

Mengambil Fleming tablet semasa mula makan atau lebih awal sebelum itu.

- Berapa lama perlu digunakan

Pastikan menghabiskan ubat ini, walaupun anda mula berasa lebih baik selepas beberapa hari.

Jika anda tidak menghabiskan ubat yang ditetapkan oleh doktor anda, jangkitan mungkin kembali atau gejala anda boleh kembali.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk mengantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda berfikir anda atau sesiapa sahaja yang mengambil berlebihan ubat ini walaupun tiada tandanya ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan segera.

Mengambil terlalu banyak ubat ini boleh menyebabkan sakit perut (rasa sakit atau cirit-birit).

Semasa menggunakan Fleming tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Simpan risalah ini. Anda mungkin perlu membacanya sekali lagi. Jika anda mempunyai pertanyaan lanjut, tanya doktor atau ahli farmasi.

Jika anda mendapat cirit-birit yang teruk beritahu doktor atau ahli farmasi anda dengan segera.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Terdapat risiko pemakaian jika anda mengambil Fleming tablet dalam tempoh penyusuan. Ini adalah kerana perkumuhan kuantiti surih dalam susu ibu. Walau bagaimanapun, ia tidak memberi kesan memudaratkan kepada bayi.

Pesakit dengan masalah fungsi hati harus menggunakan *Fleming tablet* dengan berhati-hati.

Kesan-sesan sampingan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda notis mana-mana yang berikut pada anda dan ia membimbangkan anda:

- seriawan mulut - putih, berbulu , lidah sakit dan mulut
- seriawan faraj - faraj dan / atau pelepasan sakit dan gatal
- cirit-birit ringan
- rasa sakit atau muntah
- sakit perut atau senak
- ruam dan gatal-gatal
- pening
- sakit kepala

Ini adalah kesan sampingan *Fleming tablet* yang biasa. Jika mana-mana daripada yang berikut berlaku, berhenti mengambil ubat ini dan beritahu doktor anda dengan segera, atau pergi ke Pusat Kecemasan di hospital yang terdekat :

- cirit-birit yang teruk dengan lendir darah, sakit perut dan demam
- ruam badan teruk dengan bengkak kulit yang berwarna merah jambu (gatal-gatal atau ruam)
- jangkitan yang kerap seperti demam , seram sejuk yang teruk , sakit tekak atau ulcer mulut
- kekuningan kulit atau mata anda (penyakit kuning)
- sawan • pendarahan yang luar biasa atau lebam di bawah kulit
- air kencing gelap atau najis yang pucat
- sesak nafas, semput atau kesukaran bernafas
- lepuh yang teruk dan pendarahan bibir, mata, mulut , hidung dan alat kelamin. Kesan sampingan yang lain tidak disenaraikan di atas juga boleh berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers Reporting*).

Cara penyimpanan dan pelupusan

Fleming

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Jangan simpan di atas suhu 25°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Nombor siri:

BPFK(R4/1)161215/00499

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Putih, bujur, tablet bersalut.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Fleming 625 mg Tablet

Setiap tablet mengandungi 500mg amoxicillin dan 125mg potassium clavulanate.

Fleming 1 g Tablet

Setiap tablet mengandungi 875mg amoxicillin dan 125mg potassium clavulanate.

- Bahan tidak aktif

- *Hypromellose*
- *Ethylcellulose*
- *Isopropyl Alcohol*
- *Propylene glycol*
- *Magnesium Stearate*
- *Microcrystalline Cellulose*
- *Purified Talc*
- *Croscarmellose sodium*
- *Titanium Dioxide Suspension*
- *Dichloromethane*

- Nombor MAL

Fleming 625 mg Tablet

MAL06061697A

Fleming 1 g Tablet

MAL06061694A

Pengilang

Medreich Limited

Virgonagar, Bangalore – 560 049, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

DKSH Malaysia Sdn Bhd

B-11-01, The Ascent, Paradigm,
No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor.

Tarikh kemaskini RiMUP

8/1/2016