

SULBUTIAMINE 200 CAPSULE

Sulbutiamine (200mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Sulbutiamine
2. Bagaimana Sulbutiamine berfungsi
3. Sebelum menggunakan Sulbutiamine
4. Cara menggunakan Sulbutiamine
5. Semasa menggunakan Sulbutiamine
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan Pelupusan Sulbutiamine
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang and Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Sulbutiamine

Sulbutiamine digunakan untuk rawatan semua bentuk fungsi asthenia (kekurangan kekuatan tetapi juga penyakit) contohnya,

- Fizikal dan pekerjaan intelek yang terlalu banyak;
- Sukar tumpuan;
- Keletihan tidak diatasi dengan berehat;
- Kurang kecekapan intelektual dan keadaan terang, terutamanya orang tua.

Bagaimana Sulbutiamine berfungsi

Sulbutiamine merupakan sejenis thiamine. Sulbutiamine melintasi halangan darah otak lebih mudah daripada vitamin B1 kerana sifat lipophilic dan meningkatkan pembentukan adenosina thiamine. Ia memberikan rintangan fizikal yang lebih baik, prestasi intelek yang lebih baik dan keseimbangan psikologi.

Sebelum menggunakan Sulbutiamine

- *Bila tidak boleh menggunakan*
Jangan ambil Sulbutiamine jika anda:

- Anda alah (hipersensitiviti) untuk Sulbutiamine atau mana-mana bahan-bahan lain.

Jika anda hamil, cuba untuk hamil atau fikir anda mungkin mengandung, rujuk kepada doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Jika anda sedang menyusukan bayi, rujuk kepada doktor anda sebelum mengambil ubat ini. Ini kerana Thiamine diedarkan secara meluas kepada kebanyakan tisu badan dan boleh didapati dalam susu ibu.

- *Sebelum mula mengambil*
Anda perlu berunding dengan doktor atau ahli farmasi jika anda:

- Alah (hipersensitiviti) kepada Sulbutiamine atau bahan-bahan lain dalam produk ini.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*
Rujuk dengan doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil:

- Ubat darah tinggi seperti furosemide, ethacrynic acid dan bumetanide.
- Pengambilan *thiamin* dengan makanan yang mengandungi sulfites(seperti buah-buahan kering, kerepek kentang,jem dan jus anggur).
- Pengambilan *thiamine* dengan teh, kopi dan kopi tanpa kafein.

Cara menggunakan Sulbutiamine

- *Berapa banyak harus digunakan*

Ikut semua arahan yang diberikan pada sisip dengan teliti. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk bantuan.

1 hingga 3 kapsul sebagai dos tunggal atau dalam dos dibahagikan.

Dewasa: Dos ialah 2 kapsul setiap hari dengan sarapan pagi.

- *Bila perlu digunakan*

Gunakan seperti yang diarahkan dalam risalah product ini.

- *Berapa lama perlu digunakan*
Seperti dos yang telah disyorkan

- *Jika terlupa menggunakan*

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga itu untuk mengambil ubat dan makan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos yang berganda untuk membuat untuk dos yang tertinggal itu.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat serta-merta.

Tanda-tanda dan gejala termasuk keresahan dengan perasaan yang melampau kepada keghairahan dan rasa gegaran di kaki.

SULBUTIAMINE 200 CAPSULE

Sulbutiamine (200mg)

Semasa menggunakan Sulbutiamine

- Perkara yang perlu dilakukan
Ambil dos anda betul-betul seperti yang diberikan dalam risalah tersebut.

Maklumkan kepada semua doctor, doctor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda sedang menggunakan Sulbutiamine

Dapatkan nasihat doktor dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berikan Sulbutiamine kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom yang sama atau keadaan seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Produk ini tidak memberi kesan kepada keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan
Seperti semua ubat-ubatan, Sulbutiamine boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapat mereka.

- Kesan-kesan sampingan adalah:
keresahan ringan dalam orang tua.
- alahan kulit
- bau air kencing yang tidak menyenangkan.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan

sampingan selepas mengambil Sulbutiamine ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public* → *Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Sulbutiamine

- Penyimpanan
Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan
Produk tidak harus dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana untuk melupuskan Sulbutiamine yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Sulbutiamine:
Dua keping, warna merah tua, saiz '0' kapsul sayur-sayuran keras yang mengandungi serbuk warna putih.

- Bahan-bahan kandungan
- Bahan aktif
Sulbutiamine

-Bahan tidak aktif
Sodium Starch Glycolate
Corn Starch
Colloidal Silicon Dioxide
Microcrystalline Cellulose
Magnesium Stearate

- Nombor MAL
Sulbutiamine 200 Capsule:
MAL06111366X

Pengilang

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Miles Off, Jalan Meru,
41050 Klang, Selangor Darul Ehsan.

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Miles Off, Jalan Meru,
41050 Klang, Selangor Darul Ehsan.

Tarikh kemaskini RiMUP
19/04/2017

Nombor Siri

BPFK(R4/1)190417/00085