

HYCOLIC SYRUP

Hyoscine butylbromide (5mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Hycolic*
2. Bagaimana *Hycolic* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Hycolic*
4. Cara menggunakan *Hycolic*
5. Semasa menggunakan *Hycolic*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Hycolic*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Hycolic*

Ia digunakan untuk kekejangan otot saluran penghadaman atau saluran kencing dan pembiakan. Ia juga merawat kesakitan semasa haid.

Bagaimana *Hycolic* berfungsi

Hyoscine butylbromide mengurangkan kejang otot dan pergerakan perut dan usus. Ia juga digunakan untuk keadaan lain yang berkaitan dengan kekejangan.

Sebelum menggunakan *Hycolic*

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan ambil *Hycolic* jika
- ada alahan kepada bahan aktif dan tidak aktif yang terkandung dalam *Hycolic*.
 - pembesaran kelenjar prostat, halangan usus akibat kelumpuhan otot usus, dan *pyloric stenosis* (halangan perut ke usus) dan peningkatan tekanan mata.

- Sebelum menggunakan *Hycolic*

- berhati-hati apabila digunakan oleh lelaki tua dan kanak-kanak yang demam.
- berjaga-jaga bila mengalami peningkatan denyutan jantung dalam individu dengan paras hormon tiroid yang tinggi, kegagalan jantung dan pembedahan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

- Pengambilan bersama ubat-ubat seperti di bawah mungkin menambah kesan ubat:
- amantadine (untuk selesema)
 - sesetengah antihistamina
 - butyrophenones (untuk skizofrenia)
 - phenothiazines (untuk gangguan mental)
 - tricyclic antidepressants (untuk kemurungan)

Cara menggunakan *Hycolic*

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: oral, 2 – 4 sudu teh 3 – 4 kali sehari, dos diselaraskan mengikut keperluan dan toleransi. Kanak-kanak lebih daripada 6 tahun: oral, 2 sudu teh 3 – 4 kali sehari. Bawah 6 tahun: oral, 1 – 2 sudu teh 3 kali sehari, Bayi: oral, 1 sudu teh 3 kali sehari, atau seperti yang diarahkan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan ambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Terlebih dos mungkin mengakibatkan peningkatan denyutan jantung, demam tinggi, gelisah, kekeliruan, keadaan teruja, khayalan, ruam, kegagalan peredaran dan kesukaran pernafasan.

Semasa menggunakan *Hycolic*

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor. Maklumkan kepada doktor, doktor gigi dan ahli farmasi bahawa anda mengambil *Hycolic*. Beritahu doktor dengan segera jika anda hamil atau menyusukan anak.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda. Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda. Jangan memberi *Hycolic* kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Keselamatan penggunaan ubat ini untuk wanita hamil dan menyusukan anak belum dipastikan lagi.

Kesan-kesan sampingan

Mulut kering, peningkatan tekanan mata, penglihatan kabur, kulit memerah, peningkatan denyutan jantung dan tidak teratur, pengekalan kencing, sembelit, muntah dan pening mungkin berlaku. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel:03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public* → *Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

Cara penyimpanan dan pelupusan *Hycolic*

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah suhu 25°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang tidak diperlukan.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap tanpa warna berperisa raspberi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: hyoscine butylbromide
- Bahan tidak aktif: methyl parabens, propyl parabens, perisa raspberi, liquid glucose, sodium saccharin, sodium chloride, air dan sirap.

- Nombor MAL

MAL19930043AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

17/08/2017

Nombor siri

NPRA(R4/1)170817/00217