

REDAMOL 120 SYRUP

Paracetamol (120mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Redamol 120 Syrup
2. Bagaimana Redamol 120 Syrup berfungsi
3. Sebelum mengambil Redamol 120 Syrup
4. Cara menggunakan Redamol 120 Syrup
5. Semasa menggunakan Redamol 120 Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Redamol 120 Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Redamol 120 Syrup

Redamol 120 Syrup digunakan untuk melegakan demam, sakit kepala dan simptom demam selsema dan selesema, sakit gigi, ketidakselesaan gigi dan demam selepas vaksinasi.

Bagaimana Redamol 120 Syrup berfungsi

Ia membantu melegakan kesakitan dengan menghalang pengutus kimia yang menyebabkan kesakitan dipanggil prostaglandin dalam sistem saraf pusat.

Sebelum mengambil Redamol 120 Syrup

-Bila tidak boleh mengambil:

- Jika anda alah kepada paracetamol atau aspirin atau ramuan lain dalam ubat ini. Amaran alergi: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Simptom mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini mungkin tanda-tanda keadaan yang serius. Sekiranya tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.
- Jika anda mempunyai ketagihan alkohol.
- Jika anda menghidap penyakit hati.
- Jika anda menghidap jangkitan virus.
- Jika anda mengalami gangguan fungsi buah pinggang.
- Jika anda mempunyai penyakit jantung dan saluran darah.

-Sebelum mula mengambil:

Sila beritahu doktor anda jika anda mengalami mana-mana keadaan/penyakit yang berikut:

- Kehamilan atau penyusuan.

-Jika mengambil ubat-ubat lain:

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubatan lain, ini termasuk ubat yang diperolehi tanpa preskripsi. Doktor anda mungkin perlu menukar dos ubat-ubat anda yang lain atau mengambil langkah berjaga-jaga yang lain. Dalam sesetengah kes, anda mungkin perlu menghentikan pengambilan salah satu ubat. Ini terutamanya kepada ubat-ubat yang disenaraikan di bawah yang diambil bersama-sama dengan Redamol 120 Syrup :

- Ubat antikoagulan oral (digunakan untuk mencegah pembekuan darah).
- Paracetamol (Jangan ambil ubat lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama).

Cara menggunakan Redamol 120 Syrup

-Berapa banyak harus digunakan

Kanak-kanak: 1 hingga 6 tahun-

Umur	Dos
1 – 3 tahun	6ml – 10ml
4 – 6 tahun	10ml – 15ml

Jadual di atas adalah berdasarkan grid purata berat badan kanak-kanak. Sekiranya berat badan kanak-kanak diketahui, ia sentiasa lebih tepat untuk menggunakan berat badan untuk mengira dos yang betul. Sila rujuk di bawah.

Dengan penggunaan berat badan kanak-kanak, pengiraan dos Redamol 120 Syrup diperlukan oleh kanak-kanak. Pengiraan adalah berdasarkan dos yang disyorkan sebanyak 15mg setiap berat badan.

Jadual di bawah menunjukkan dos Redamol 120 Syrup yang perlu diberikan, berdasarkan berat badan:

Berat kanak-kanak		Redamol 120 Syrup
kg	lb	
10	22	6 ml
15	33	9 ml
20	44	13 ml
30	66	19 ml

Nota: 1kg = 2.2lb

-Bila perlu digunakan

Diberi dalam selang 6 jam, tidak melebihi 4 kali sehari. Ambil ubat seperti yang diberitahu oleh doktor anda. Dos tersebut akan dipamerkan pada label ubat. Periksa label ubat dengan teliti. Ianya dinyatakan berapa banyak dos yang anda perlu ambil dan berapa kerap. Jika anda tidak pasti, tanya pada doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Sentiasa mengambil sirap selagi anda diberitahu kecuali anda mengalami sebarang masalah. Untuk kes ini, periksa dengan doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil satu dos, jangan risau. Ambil dos tersebut sebaik sahaja anda mengingatnya dan teruskan seperti biasa. Jika anda tidak mengambil dos anda untuk satu hari, ambil dos biasa anda pada hari berikutnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda tidak sengaja mengambil dos yang berlebihan, hubungi doktor atau ahli farmasi anda, atau jabatan kecemasan hospital yang berdekatan dengan segera.

Simptom Redamol 120 Syrup dos berlebihan termasuk cirit-birit, muntah atau loya, hilang selera makan, kekejangan atau sakit perut dan peningkatan peluh yang luar biasa.

Semasa menggunakan Redamol 120 Syrup

-Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda seperti yang disarankan oleh doktor anda.

REDAMOL 120 SYRUP

Paracetamol (120mg/5ml)

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Redamol 120 Syrup.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandungi semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Ubat ini dipreskripsikan untuk anda. Jangan beri ubat ini kepada orang lain. Ia mungkin tidak sesuai untuk mereka, walaupun simptom-simptom yang mereka alami adalah sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Penjagaan khas disyorkan semasa kehamilan. Hanya ambil ubat ini semasa mengandungi jika disyorkan oleh doktor apabila faedah melebihi kemudaratan pada bayi.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Redamol 120 Syrup boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami kesan sampingan semasa mengambil ubat ini:

- Air kencing berdarah atau keruh.
- Kesukaran atau kesakitan membuang air kencing.
- Kekerapan keinginan untuk membuang air kencing.
- Pengurangan jumlah air kencing secara mendadak.
- Kehadiran sel putih dalam air kencing.
- Ruam, geligata, gatal.
- Sakit tekak dan demam yang tidak dapat dijelaskan.
- Keletihan atau kelemahan yang luar biasa.
- Kekuningan mata atau kulit.
- Tindak balas hipersensitiviti kulit (tindak balas termasuk ruam kulit, bengkak bawah kulit, *Stevens Johnson Syndrome* atau *Toxic Epidermal Necrolysis*).

Jika anda mendapati kesan yang tidak diingini yang tidak disebut di

dalam risalah ini, sila laporkan kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau tindak balas alahan terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel.:03-78835550 atau laman web npra.moh.gov.my (*Public → Reporting Side effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Redamol 120 Syrup

-Penyimpanan

Simpan di tempat kering di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

-Pelupusan:

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk:

Sirap berperisa buah-buahan yang berwarna merah,.

-Bahan-bahan

-Bahan aktif:

Paracetamol.

-Bahan-bahan tidak aktif:

Colour ponceau, strawberry flavour, raspberry flavour, propyl paraben, sodium saccharin, glycerine, refined sugar, citric acid anhydrous, sodium benzoate, polyethylene glycol, methyl paraben dan purified water.

-Nombor MAL

MAL19910340XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Royce Pharma Manufacturing Sdn.Bhd.

PT 1663, Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP
03/05/2018

Nombor Siri

NPRA(R4/1)100418/00103