

LANOXIN TABLETS / PG TABLETS

Digoxin (250mcg, PG 62.5mcg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Lanoxin Tablet
2. Bagaimana Lanoxin Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Lanoxin Tablet
4. Cara menggunakan Lanoxin Tablet
5. Semasa menggunakan Lanoxin Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Lanoxin Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Lanoxin Tablet

Lanoxin Tablet digunakan untuk merawat aritmia dan kegagalan jantung. Aritmia ialah keadaan tidak sekata pada denyut jantung, yang menyebabkan jantung berdenyut dengan melangkau satu denyutan atau berdenyut pada kelajuan yang salah.

Bagaimana Lanoxin Tablet berfungsi

Lanoxin Tablet mengandungi bahan aktif digoxin, yang termasuk dalam kumpulan ubat yang dinamakan *cardiac glycosides*.

Lanoxin Tablet berfungsi membetulkan denyut jantung yang tidak sekata kepada rentak yang normal dan menguatkan daya denyut jantung, dan oleh itu sangat berguna dalam merawat kegagalan jantung.

Sebelum menggunakan Lanoxin Tablet

- *Bila tidak boleh menggunakan*

Jangan ambil Lanoxin Tablet jika anda mempunyai alahan kepada digoxin, *cardiac glycosides* yang lain atau apa-apa ramuan lain dalam ubat ini.

Lanoxin Tablet tidak boleh digunakan oleh pesakit yang menghidap masalah jantung yang tertentu. Doktor akan mengkaji sejarah perubatan sebelum merawat anda dengan ubat ini. Jika ada apa-apa perkara yang membimbangkan, bincangkannya dengan doktor anda.

- *Sebelum menggunakan Lanoxin Tablet*

Jika anda hamil atau berniat untuk hamil atau menyusukan anak anda perlu berbincang dengan doktor anda. Doktor anda akan membincangkan kemungkinan risiko dan manfaat yang terlibat.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Anda **mesti** memberitahu doktor atau ahli farmasi anda tentang semua ubat yang sedang diambil, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi doktor, dan juga ramuan herba seperti *St. John's wort* dan vitamin. Digoxin berinteraksi dengan banyak jenis ubat. Ubat lain yang anda ambil boleh meningkatkan atau mengurangkan kesan Lanoxin Tablet. Ini boleh menyebabkan Lanoxin Tablet tidak berfungsi dengan betul, boleh meningkatkan peluang mengalami kesan sampingan atau boleh menyebabkan kesan sampingan menjadi lebih teruk.

Cara menggunakan Lanoxin Tablet

- *Berapa banyak harus digunakan*

Doktor akan menentukan dos Lanoxin Tablet yang betul untuk anda, dan berapa kerap anda perlu mengambilnya.

Ikut semua arahan yang diberikan oleh doktor anda dengan teliti. Arahan ini mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada pek, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk bantuan.

- *Bila perlu digunakan*

Anda harus cuba untuk mengambil Lanoxin Tablet pada masa yang sama setiap hari.

Lanoxin Tablet boleh diambil dengan kebanyakan makanan. Walau bagaimanapun, anda harus mengelak daripada mengambil dengan makanan yang tinggi dengan serat, kerana jumlah Lanoxin diserap ke dalam badan boleh dikurangkan.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan pengambilan Lanoxin Tablet selama yang doktor anda mencadangkan.

- *Jika terlupa menggunakan*

Jika anda terlupa mengambil satu dos, ambil ia sebaik sahaja anda ingat, dan kemudian terus seperti sebelum ini. Jangan ambil dos berganda untuk membuat untuk dos individu dilupakan. Jika lebih daripada satu dos yang terlepas, hubungi doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat.

- If mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital yang berdekatan jika anda berfikir bahawa anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak Lanoxin Tablet.

Ini mesti dilakukan walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak tablet boleh menyebabkan pening yang teruk, penglihatan kabur, degupan jantung yang tidak teratur, rasa sakit, cirit-birit dan ruam kulit.

Semasa menggunakan Lanoxin Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Sesetengah penyakit boleh mempengaruhi fungsi Lanoxin Tablet. Dalam kes tertentu, anda mungkin menghadapi kemungkinan yang lebih besar mengalami kesan sampingan, yang mungkin serius. Anda mungkin perlu diperiksa lebih kerap atau dos Lanoxin Tablet anda perlu dikurangkan. Beritahu doktor jika anda mengalami mana-mana keadaan yang berikut:

- jika baru-baru ini anda mengalami serangan jantung atau masalah jantung yang lain pada masa lalu;
- jika anda mengalami masalah kelenjar tiroid;
- jika anda mengalami masalah pernafasan yang teruk;
- jika anda menghidap atau pernah menghidap penyakit buah pinggang.

Semasa dirawat dengan Lanoxin Tablet, sampel darah anda mungkin diambil pada sela masa tertentu untuk memeriksa jika ada apa-apa yang tidak normal atau untuk memeriksa jumlah digoxin dalam darah anda. Dos yang sedang diambil mungkin perlu diubah. Ini penting terutamanya pada pesakit yang lebih tua atau mereka yang menghidap atau yang pernah menghidap penyakit buah pinggang.

Jika anda menjalani ujian jantung ECG (elektrokardiogram), beritahu orang yang akan menjalankan ujian itu yang anda sedang mengambil Lanoxin Tablet, kerana ia boleh menjejaskan tafsiran keputusan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil Lanoxin Tablet tanpa terlebih dahulu berbincang dengan doktor anda. Berhenti dengan tiba-tiba boleh menyebabkan keadaan jantung anda menjadi bertambah teruk. Walau pun anda rasa lebih sihat, anda perlu meneruskan pengambilan ubat ini untuk membantu jantung anda berfungsi dengan betul.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan mengambil Lanoxin Tablet untuk merawat sebarang masalah lain melainkan jika doktor anda memberitahu anda.

Jangan berikan Lanoxin Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini boleh menyebabkan pening, kekeliruan dan masalah penglihatan pada sesetengah orang. Ia boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mesin digunakan.

Jika Lanoxin Tablet membuat anda merasa sakit, pening atau letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Lanoxin Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan. Walau bagaimanapun, kebanyakannya berlaku kerana dos yang terlalu tinggi. Oleh itu, doktor anda perlu menyesuaikan dos ini. Manfaat yang dijangka bagi ubat ini lebih tinggi daripada risiko mengalami apa-apa kesan sampingan yang memudaratkan. Berikut adalah kesan sampingan yang dilaporkan daripada pesakit yang mengambil Lanoxin Tablet.

Kesan yang kerap:

bermaksud antara 1 dalam 10 dan 1 dalam 100 orang mungkin mengalaminya.

- Disorientasi, pening kepala, masalah penglihatan (penglihatan kabur atau kekuningan).
- Perubahan dalam rentak atau kadar denyut jantung anda. Jantung anda mungkin berdenyut lebih perlahan atau tidak tetap.
- Rasa loya atau rasa hendak muntah, cirit-birit.
- Ruam kulit.

Kesan yang tidak kerap:

bermaksud 1 dalam 100 dan 1 dalam 1,000 orang mungkin mengalaminya.

- Kemurungan.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda dapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, or atau laman web npra.moh.gov.my (*Public → Reporting Medicinal Problems/ Side Effects/ AEFI / Vaccine Safety*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Lanoxin Tablet

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Jika doktor atau ahli farmasi anda mengarahkan anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini sudah melepasi tarikh luputnya, sila tanya ahli farmasi anda apa yang patut dilakukan dengan sebarang ubat yang tinggal. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Lanoxin 250 Micrograms Tablets

- Tablet putih, bulat, dwicembung dengan garisan pembahagi dua dan dicetak tenggelam "D025" pada sisi yang sama dan kosong pada sisi yang satu lagi. Setiap tablet mengandungi 250mcg (0.250mg) Digoxin BP.

Lanoxin PG 62.5mcg Tablets

- Tablet biru, bulat, dwicembung, dicetak tenggelam "D06" pada satu sisi dan kosong pada sisi yang satu lagi. Setiap tablet mengandungi 62.5mcg (0.062.5mg) Digoxin BP.

- Bahan-bahan kandungan

Lanoxin 250 Micrograms Tablets

Bahan aktif:

- Digoxin

Bahan tidak aktif:

- Purified water
- Magnesium stearate
- Rice starch
- Oxidized starch
- Maize starch
- Lactose monohydrate

Lanoxin PG 62.5mcg Tablets

Bahan aktif:

- Digoxin

Bahan tidak aktif:

- Purified water
- Indigo carmine FD&C Blue No. 2
- Povidone
- Rich starch
- Magnesium stearate
- Oxidized starch
- Lactose monohydrate
- Maize starch

- Nombor MAL

Lanoxin 250 Micrograms Tablets

- MAL19983999AZ

Lanoxin PG 62.5mcg Tablets

- MAL19973575AZ

Pengilang

Aspen Bad Oldesloe GmbH
Industriestrasse 32-36,
D-23843 Bad Oldesloe,
Germany.

Pemegang Pendaftaran Produk

Aspen Medical Products
Malaysia Sdn Bhd
(1004761-W)
Unit 1302A, Level 13A,
Uptown 1, 1 Jalan SS21/58,
Damansara Uptown, 47400
Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

17/02/2017

Nombor Siri

NPRA (R1/1) 04012018/002