

ZIRAX TABLET

Acyclovir (400mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Zirax
2. Bagaimana Zirax berfungsi
3. Sebelum mengambil Zirax
4. Cara menggunakan Zirax
5. Semasa menggunakan Zirax
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Zirax
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Zirax

Ia digunakan untuk merawat jangkitan virus atau jangkitan berulang virus seperti cacar air, kayap, kudis sejuk, herpes mata atau herpes genital.

Bagaimana Zirax berfungsi

Acyclovir adalah ubat antiviral yang digunakan dalam rawatan dan pencegahan jangkitan virus. Ia dapat membunuh atau menghentikan pertumbuhan virus.

Sebelum mengambil Zirax

- Bila tidak boleh mengambil

- Jika mempunyai alahan terhadap acyclovir dan ramuan lain Zirax.

- Sebelum menggunakan Zirax

Beritahu doktor atau ahli farmasi

- Jika tidak pasti cara menggunakan Zirax.
- Jika terdapat masalah hati atau ginjal.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika menggunakan ubat-ubat di bawah:

- probenecid, digunakan untuk rawatan gout
- zidovudine, digunakan sebagai antivirus

Cara menggunakan Zirax

- Berapa banyak harus diambil

Untuk rawatan penyakit herpes (termasuk herpes genital) – 200mg lima kali sehari (biasanya setiap 4 jam semasa berjaga) selama 5 – 10 hari.

Untuk pencegahan jangkitan berulang – 200mg dua hingga lima kali sehari (perlu membuat penilaian semula dengan **penilaian** keadaan jangkitan setiap 6 - 12 bulan) atau 400mg dua kali sehari.

Untuk rawatan cacar air atau kayap – 800mg lima kali sehari (setiap 4 jam

semasa berjaga) selama 7 – 10 hari.

Nota: Beritahu doktor jika anda mempunyai masalah buah pinggang supaya dos boleh diselaraskan.

- Bila perlu diambil

Selalu ambil Zirax mengikut arahan doktor anda. Anda perlu semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika tidak pasti.

- Berapa lama perlu diambil

Anda perlu semak dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa mengambil

Gunakan dos sebaik sahaja teringat. Walau bagaimanapun, jika menghampiri masa untuk dos yang seterusnya, abaikan dos yang terlepas. Jangan mengambil dos berganda sebagai gantian dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan(terlebih dos)

Jika terlebih mengambil dos Zirax, hubungi doktor, jabatan kecemasan atau pusat racun dengan segera.

Semasa menggunakan Zirax

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang anda sedang ambil.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan memberi ubat ini kepada sesiapa walaupun tanda-tanda penyakit mereka serupa, kerana ini mungkin mendatangkan mudarat.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jikalau anda hamil, menjadi hamil atau menyusukan anak semasa rawatan, anda tidak patut mengambil Zirax, kecuali diarahkan oleh doktor. Doktor anda akan mempertimbangkan manfaat dan risiko rawatan kepada anda dan bayi anda.

Kesan-kesan sampingan

Gangguan gastrousus (loya, muntah, cirit-birit), sakit kepala, ruam kulit, kulit atau putih mata menjadi kekuningan (jaundis), masalah buah pinggang seperti kurang atau tidak membuang air kencing, pening, letih, kekeliruan, halusinasi, gelisah, menggeletar, mengantuk, psikosis (masalah mental), konvulsi dan koma. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada

Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers → Reporting*)

Cara penyimpanan dan pelupusan Zirax

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, di bawah 30°C. Jauhkan daripada cahaya. Jauhkan daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang tidak diperlukan.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet berbentuk segienam berwarna coklat muda dan tertera segitiga pada satu permukaan dan ‘ZIRAX’ pada permukaan sebelah.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: acyclovir
- Bahan tidak aktif: lactose monohydrate, sunset yellow lake, carmoisine lake, cornstarch, polyvinylpyrrolidone, magnesium stearate, microcrystalline cellulose dan croscarmellose sodium..

- Nombor MAL:

MAL19987377AZ

Pengilang dan Pemegang pendaftaran produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

04/06/2015

Nombor siri:

BPFK(R4/1)020615/00135