

VOXYTANE TABLET

Oxybutynin Chloride (5mg)

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Voxytane
2. Bagaimana Voxytane berfungsi
3. Sebelum menggunakan Voxytane
4. Cara menggunakan Voxytane
5. Semasa menggunakan Voxytane
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Voxytane
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Voxytane

Voxytane digunakan untuk melegakan simptom-simptom ketidakstabilan pundi kencing seperti keperluan yang kuat untuk kencing dengan segera dan kencing yang kerap, kebocoran kencing yang tidak sengaja, kesakitan atau ketidakselesaan semasa kencing.

Bagaimana Voxytane berfungsi

Oxybutynin mengendurkan otot licin pundi kencing. Oxybutynin meningkatkan kapasiti pundi kencing, mengurangkan kekerapan pengecutan otot pundi kencing dan melambatkan keinginan untuk kencing. Oleh itu, ia mengurangkan keperluan untuk kencing dengan segera dan kekerapan episod inkontinens dan pembuangan air kencing secara voluntari.

Sebelum menggunakan Voxytane

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ubat ini tanpa nasihat daripada Doktor atau Ahli Farmasi.

Jangan mengambil ubat ini jika anda mengalami masalah perubatan berikut:

- Alahan (hipersensitif) kepada Oxybutynin atau bahan kandungan lain yang disenaraikan pada akhir risalah ini
- Tekanan mata tinggi
- Tidak dapat membuang air kencing
- Tumor prostat

- Keradangan salur pernafasan utama dalam paru-paru
- Masalah otot seperti *myasthenia*
- keradangan dan ulser (luka) dalam saluran pencernaan / pembesaran usus besar
- Kelemahan otot usus
- Kencing luar kawalan pada waktu malam

Voxytane tidak disyorkan untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun.

Mengandung dan menyusukan anak

Sila rujuk kepada doktor anda sebelum mengambil Voxytane jika anda mengandung, merancang untuk mengandung, menyusukan anak atau bercadang untuk menyusukan anak. Doktor anda akan menimbangkan risiko berbanding manfaat yang mereka jangkakan jika anda mengambil Voxytane.

Oxybutynin dijumpai dalam susu ibu, oleh itu ia tidak boleh diambil oleh ibu-ibu yang sedang menyusu.

- Sebelum menggunakan Voxytane

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil Voxytane.

Oxybutynin harus digunakan dengan berhati-hati untuk warga tua.

Beritahu doktor anda jika anda mengalami atau pernah mengalami mana-mana masalah perubatan yang berikut:

- Kelenjar tiroid terlalu aktif (hipertiroidisme)
- Penyakit jantung
- Kegagalan jantung
- Degupan jantung yang tidak teratur
- Benjolan di perut (*hiatal hernia*)
- Kadar denyutan jantung semasa rehat yang cepat (takikardia)
- Tekanan darah tinggi
- Kelemahan otot (*myasthenia gravis*)
- Pembesaran kelenjar prostat (*prostatic hypertrophy*)

- Kerosakan hati atau buah pinggang

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat boleh mengganggu antara satu sama lain apabila diambil dengan Voxytane. Sila beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat-ubatan seperti:

- Amantadine (ubat antivirus dan ubat antiparkinsonian yang digunakan untuk merawat gangguan sistem saraf progresif yang mempengaruhi pergerakan)
- Ubat Antiparkinsonian seperti biperiden, levodopa
- Antihistamin
- Antipsikotik seperti phenothiazines, butyrophenones, clozapine
- Quinidine (digunakan untuk merawat atau mencegah degupan jantung tidak teratur)
- Tricyclic antidepressant
- Atropine (digunakan untuk merawat keracunan racun perosak dan untuk mengurangkan pengeluaran air liur semasa pembedahan)
- Antispasmodics (untuk merawat kekejangan otot)
- Dipyridamole (untuk menghalang pembekuan darah)

Cara menggunakan Voxytane

- Berapa banyak harus digunakan

- Gunakan mengikut arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi.
- Bagi orang dewasa, ambil 5mg dua hingga tiga kali sehari atau maksimum empat kali sehari. Bagi kanak-kanak lebih 5 tahun, ambil 5mg dua kali sehari.
- Ubat ini hendaklah diambil secara oral dengan segelas air yang penuh.

<ul style="list-style-type: none">Jangan melebihi dos yang disyorkan melainkan ditetapkan oleh doktor. <p>- <u>Bila perlu digunakan</u></p> <p>Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.</p> <p>- <u>Berapa lama perlu digunakan</u></p> <p>Teruskan penggunaan Voxytane untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.</p> <p>- <u>Jika terlupa menggunakan</u></p> <p>Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.</p> <p>Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.</p> <p>- <u>Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)</u></p> <p>Dalam mana-mana kes terlebih dos, sila hubungi doktor anda atau dapatkan rawatan perubatan kecemasan dengan segera jika simptom-simptom di bawah berlaku.</p> <p><u>Simptom:</u></p> <ul style="list-style-type: none">kegelisahanmengeletarcepat marahsawankekeliruan dan halusinasi (pengalaman di mana anda melihat, mendengar, merasa, atau menghidu sesuatu yang tidak wujud)memerahdemamdehidrasidegupan jantung yang tidak teraturmuntahpengekalan kencing	<ul style="list-style-type: none">mengantuk <p>Semasa menggunakan Voxytane</p> <p>- <u>Perkara yang perlu dilakukan</u></p> <p>Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.</p> <p>Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Voxytane.</p> <p>Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.</p> <p>- <u>Perkara yang tidak boleh dilakukan</u></p> <p>Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.</p> <p>Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor.</p> <p>Jangan memberi Voxytane kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.</p> <p>- <u>Perkara yang perlu diberi perhatian</u></p> <p>Elakkan badan daripada menjadi terlalu panas dan berada dalam cuaca yang panas. Oxybutynin boleh mengurangkan peluh dan anda mungkin lebih mudah mendapat strok haba dan demam.</p> <p>Ubat ini boleh menyebabkan rasa mengantuk dan boleh meningkatkan kesan alkohol. Jika terjejas, jangan memandu kenderaan atau mengendalikan jentera. Elakkan minuman beralkohol.</p> <p>Kesan-kesan sampingan</p> <p>Kesan-kesan sampingan termasuk mulut kering dengan kesukaran untuk menelan dan bercakap, dahaga, kekurangan rembesan mukus dari saluran pernafasan, pembesaran anak mata dengan kehilangan keupayaan fokus dan sensitiviti melampau kepada cahaya, muka memerah dan kulit kering, penurunan sementara denyutan jantung diikuti oleh peningkatan kadar denyutan jantung dengan perasaan debaran jantung</p>	<p>dan denyutan jantung yang tidak teratur, kesukaran pemuangan air kencing dan juga sembelit.</p> <p>Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (<i>Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety</i>).</p> <p>Cara penyimpanan dan pelupusan Voxytane</p> <p>- <u>Penyimpanan</u></p> <p>Simpan di bawah suhu 25°C. Lindungi daripada cahaya matahari, haba dan kelembapan. Sentiasa simpan dalam bungkusan asal yang disediakan.</p> <p>Jauhi daripada Kanak-Kanak.</p> <p>- <u>Pelupusan</u></p> <p>Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.</p> <p>Maklumat lanjut</p> <p>- <u>Rupa dan warna produk</u></p> <p>Voxytane 5mg Tablet adalah tablet bulat berwarna putih, tidak bersalat dengan permukaan rata pada kedua-dua permukaan dan skor pada satu permukaan.</p> <p>- <u>Bahan-bahan kandungan</u></p> <p>- Bahan aktif: Oxybutynin Chloride</p> <p>- Bahan tidak aktif: Lactose (Super Tab), Corn starch, Microcrystalline cellulose, Sodium Starch Glycolate, Colloidal silicon dioxide, Magnesium Stearate</p> <p>- <u>Nombor MAL</u> MAL09072781ACZ</p>
---	--	---

Pengilang

Winwa Medical Sdn Bhd
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Pharm-D Sdn Bhd
8B, Jalan 1/137C, Bedford Business
Park, Off Jalan Kelang Lama,
58000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

27/02/2017

Nombor siri:

BPFK(R4/1)270217/00006