

CETRIZET TABLETS

Cetirizine Hydrochloride (10 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Cetirizet*
2. Bagaimana *Cetirizet* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Cetirizet*
4. Cara menggunakan *Cetirizet*
5. Semasa menggunakan *Cetirizet*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Cetirizet*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Cetirizet*

Dewasa dan kanak-kanak berumur 3 tahun atau ke atas

Cetirizet digunakan untuk rinitis (radang membran mukus dalam hidung) bermusim, rinitis alergi perenial (sepanjang tahun) dan urtikaria (ruam merah dan gatal yang timbul) yang berasal dari alergi.

Bagaimana *Cetirizet* berfungsi

Cetirizet tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil antihistamina.

Antihistamina membantu mengurangkan gejala alahan dengan menghalang kesan histamina, yang dihasilkan dalam badan semasa reaksi alahan.

Sebelum menggunakan *Cetirizet*

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan *Cetirizet* jika anda:

- Alahan (hipersensitif) kepada cetirizine hydrochloride atau mana-mana bahan-bahan lain dalam ubat.

Jangan mengambil ubat ini jika mana-mana di atas berkaitan dengan anda. Jika anda tidak pasti, bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil *Cetirizet*.

Mengandung dan menyusukan anak

Cetirizet tidak harus digunakan dalam tempoh 3 bulan pertama kehamilan atau jika anda menyusukan anak.

Sebelum mula menggunakan *Cetirizet*

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai masalah buah pinggang.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau telah baru-baru ini mengambil apa-apa ubat-ubatan lain. Ini termasuk ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi.

Cetirizet harus digunakan dengan berhati-hati jika sedatif juga sedang diambil.

Cara menggunakan *Cetirizet*

Sentiasa mengambil *Cetirizet* seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Berapa banyak harus digunakan

Dewasa:

Dos yang disyorkan adalah 10mg sekali sehari.

Kanak-kanak 6 tahun dan ke atas:

Dos yang disyorkan ialah 10mg setiap hari, sama ada 5mg dua kali sehari atau 10mg sekali sehari

Kanak-kanak 3 - 6 tahun:

Dos yang disyorkan adalah 5 mg setiap hari, sama ada 2.5mg dua kali sehari atau 5mg sekali sehari.

Jika anda mempunyai masalah buah pinggang, dos perlu dikurangkan kepada separuh dos harian yang disyorkan.

Jika anda terjejas oleh kesan sampingan, dos yang boleh diambil sebagai 5mg pada waktu pagi dan 5mg pada waktu petang.

Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Anda digalakkan untuk mengambil ubat dengan sedikit cecair semasa makan malam kerana gejala di mana produk diberi biasanya muncul pada waktu malam.

Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk mengambil pil, ambil satu sebaik sahaja anda ingat

melainkan jika ia hampir masa untuk mengambil dos yang seterusnya. Jangan sekali-kali mengambil dua dos bersama-sama untuk menggantikan dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan kesan mengantuk.

Semasa menggunakan *Cetirizet*

Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti yang doktor anda telah memberitahu anda.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

Beritahu semua doktor dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil *Cetirizet*.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil apa-apa ubat-ubatan baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berkongsi *Cetirizet* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera
Berhati-hati ketika memandu atau menggunakan mesin sehingga anda tahu bagaimana ubat ini memberi kesan kepada anda. Kejadian mengantuk telah dilaporkan pada sesetengah orang.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, *Cetirizet* kadang-kadang boleh memberi kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Terdapat laporan

CETRIZET TABLETS

Cetirizine Hydrochloride (10 mg)

sekali sekala kesan sampingan subjektif yang ringan dan sementara seperti, sakit kepala, pening, mengantuk, agitasi, mulut kering dan ketidakselesaan gastrousus.

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika apa-apa kesan sampingan menjadi serius atau berlarutan sehingga lebih daripada beberapa hari, atau jika anda perasan apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public→Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara penyimpanan dan pelupusan Cetrizet

Penyimpanan

Simpan di tempat yang kering dan dingin di bawah 25°C. Lindungi daripada cahaya. Jauhkan dari jangkauan kanak-kanak.

Jangan simpan ubat-ubatan di bilik mandi, atau berhampiran sink, atau pada ambang tingkap.

Jangan biarkan ia di dalam kereta terutamanya pada hari-hari panas. Haba dan kelembapan boleh memusnahkan ubat-ubatan.

Jangan gunakan ubat anda selepas tarikh tamat yang dinyatakan pada pek selepas 'EXP'. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan itu.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem berwarna putih bulat mempunyai garis pecah di satu permukaan dan rata di sebelah lain.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Cetirizine Hydrochloride

Bahan-bahan tidak aktif

Lactose

Starch

Polyvinyl Pyrrolidone K30

Microcrystalline Cellulose

Purified Talc

Magnesium Stearate

Colloidal Silicon Dioxide

Sodium Starch Glycolate

Eudragit E 100

Titanium Dioxide

Polyethylene Glycol 6000

Sodium Lauryl Sulphate

MAL number: MAL20040222AZ

Pengilang

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Survey No 214, Plot No. 20,
Govt. Industrial Area, Phase II,
Piparia, Silvassa-396230
U.T. Of Dadra & Nagar Haveli
India

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979 Jalan Teratai, 5 ½ Mile Off
Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

09/03/2017

Nombor siri:

BPFK(R4/1)070317/00019