

CHLORPROMAZINE TABLET 25 mg® AND 100 mg®

CHLORPROMAZINE TABLET 25 mg and 100 mg

Apakah yang ada pada risalah ini:

1. Apakah kegunaan Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg
2. Bagaimana Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg berfungsi
3. Sebelum mengambil Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg
4. Cara pengambilan Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg
5. Semasa menggunakan Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Diskripsi produk

Apakah kegunaan Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg

Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg digunakan untuk rawatan gangguan tingkah laku. Ubat ini digunakan untuk rawatan jangka pendek untuk keresahan, Pergolakan dan tingkah laku ganas. Ubat ini juga digunakan untuk sedu berterusan, loya dan muntah yang berkaitan dengan gangguan otak.

Bagaimana Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg berfungsi

Ubat ini mengandungi chlorpromazine. Chlorpromazine bekerja menyekat tindakan zat kimia yang disebut dopamin yang bertindak di sistem saraf dalam otak.

Sebelum mengambil Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg

Jangan mengambil Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg dan beritahu doktor anda jika anda mempunyai:

1. Alahan terhadap chlorpromazine.
2. Mengandung atau sedang menyusui.
3. Sejarah dalam masalah darah.
4. Penyakit jantung yang teruk.
5. Deria pancaindera seperti rasa mengantuk atau tidak selaras, penglihatan kabur, tidak jelas perkataannya, kurang sedar terhadap persekitaran.

Cara pengambilan Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg

Berapa banyak untuk diambil

Sentiasa mengambil ubat Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg tepat seperti arahan doktor anda. Jika anda tidak pasti, tanyakan dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Dos:

Pesakit boleh mengambil ubat sejak dari awal, mulai dari 25-50 mg tiga kali sehari dan ditingkatkan jika perlu. Dos biasa ialah 25-100 mg 3 kali sehari.

Penyakit psikotik mungkin memerlukan dos 1g atau lebih sehari.

Dalam rawatan kecanduan alkohol yang ringan, pesakit yang gelisah boleh diberi dos 25-50 mg dua kali sehari. Pesakit dengan gejala kurang teruk diberikan 30-75 mg dalam dos yang dibahagikan. Chlorpromazine tidak perlu dibagikan pada pesakit 'stoporous'.

Penggunaan untuk kanak-kanak tidak digalakkan.

Bila ubat diambil

Ambil ubat dengan air. Jika anda mengambil antasid, and perlu sekurang-kurangnya 2 jam selepas mengambil chlorpromazine.

Jika anda lupa mengambil ubat

Jika anda terlewat mengambil dos Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg, ambil ubat secepat mungkin. Jika hampir masa untuk dos berikutnya, lewatkan dos tersebut dan kembali ke jadual dos rutin. Jangan mengambil 2 dos sekaligus.

Jika anda mengambil ubat terlalu banyak

Jika anda mengambil dos lebih dari yang ditetapkan, hubungi doktor atau ahli farmasi anda. Tanda-tanda dos berlebihan adalah nafas yang cepat dan pendek, suhu badan yang rendah, tekanan darah rendah, kegelisahan, badan berpusing, sawan, denyut jantung yang tak biasa dan koma.

Semasa menggunakan

Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg

1. Jangan mengambil lebih dari dos yang disyorkan.
2. Anda dinasihatkan untuk mengelakkan pengambilan alkohol.
3. Chlorpromazine tidak sesuai digunakan bersama ubat ampicillin, atropin sulfat, benzilpenicillin, chloramphenicol, heparin, hydrocortisone hydrogen succinate, metaraminol, methicillin, oxytetracycline, thiopentone sodium, vitamin B dan C injeksi.

Kesan-kesan sampingan

Kesan-kesan sampingan termasuk mengantuk, kekeringan mulut, kesesakan hidung, 'postural hypotension', menurunkan suhu badan, detak jantung yang cepat, ritma jantung yang tak biasa, halusinasi, insomnia, kemurungan, pandangan yang tak jelas, kulit sensitif terhadap cahaya, sawan, perencatan ejakulasi.

Cara penyimpanan dan pelupusan

Penyimpanan

Simpan ke dalam bekas yang tertutup rapat dan diletak ditempat yang kering, dibawah suhu 25°C. Jauhi dari cahaya dan kanak-kanak.

Pelupusan

Jangan buang ubat ke dalam longkang dan tong sampah. Bertanyakan kepada ahli farmasi anda cara membuang ubat yang tidak diperlukan lagi.

Diskripsi produk

Rupa dan warna tablet

Chlorpromazine Tablet 25 mg and 100 mg adalah tablet bulat bersalut gula berwarna kemerahan jingga. Saiz pek adalah: Botol plastik dari 30 tablet dan Botol plastik dari 500 dan 1000 tablet (untuk Tender atau Eksport sahaja).

Bahan-bahan

Bahan aktif ubat adalah chlorpromazine sama ada 25 mg dan 100 mg per tablet.

Bahan lain dari Chlorpromazine Tablet 25 mg adalah laktosa, 'povidone', ethanol 96%, 'sodium starch glycolate', magnesium stearat, serbuk talkum, akasia, 'light calcium carbonate', kanji jagung, 'titanium dioxide', 'light magnesium carbonate', Warna FDC No. 6, 'plain syrup', 'PVP shellac', larutan pengilap.

Bahan lain dari Chlorpromazine Tablet 100 mg adalah laktosa, 'povidone', ethanol 96%, 'sodium starch glycolate', magnesium stearat, serbuk talkum, akasia, 'light calcium carbonate', kanji jagung, 'plain syrup', 'titanium dioxide', 'colour FDC yellow no. 6 lake'.

Nombor Pendaftaran:

Chlorpromazine Tablet 25 mg:

MAL19860201A

Chlorpromazine Tablet 100 mg:

MAL19860027A

Dikilangkan oleh:

Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd (661901-P)

Lot 24, Bakar Arang Industrial Estate, Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

Tarikh semakan:

Pemegang Kuasa Pemasaran