

GLUCO-S1500 POWDER FOR ORAL SOLUTION

Glucosamine Sulfate 1500mg

Apa yang ada dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan Serbuk GLUCO-S1500
2. Bagaimana Serbuk GLUCO-S1500 berfungsi
3. Sebelum mengambil Serbuk GLUCO-S1500
4. Cara penggunaan Serbuk GLUCO-S1500
5. Semasa menggunakan Serbuk GLUCO-S1500
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Serbuk GLUCO-S1500
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Serbuk GLUCO-S1500

Serbuk GLUCO-S1500 digunakan sebagai terapi yang membantu penyakit osteoarthritis, keadaan perubatan di mana tulang rawan yang berfungsi sebagai kusyen hujung tulang dalam sendi merosot dari masa ke masa, akhirnya menyebabkan kesakitan dan menjelaskan pergerakan.

Bagaimana Serbuk GLUCO-S1500 berfungsi

Glucosamine adalah satu komponen semula jadi untuk tulang rawan - yang ditemui dalam sendi di antara tulang. Ia dihasilkan oleh badan, tetapi keupayaan untuk berbuat demikian merosot dengan usia. Penyelidik berfikir bahawa pengambilan Glucosamine suplemen mungkin membantu meningkatkan kandungan rawan dalam sendi.

Sebelum mengambil Serbuk GLUCO-S1500

Bila tidak boleh mengambil

Anda tidak boleh mengambil Serbuk GLUCO-S1500

- jika anda alergi terhadap Glucosamine atau mana-mana bahan-bahan lain yang di dalam gluco-S1500 Serbuk untuk larutan oral.

- jika anda alergi terhadap kerang, kerana Glucosamine diperolehi dari kerang.
- jika anda mengalami gangguan metabolismik genetik (Phenylketonuria).

Sebelum mula mengambil

Ambil Serbuk GLUCO-S1500 seperti yang diarahkan pada label, atau sebagaimana yang ditetapkan oleh doktor anda. Jangan gunakan ia dalam kuantiti yang berlebihan atau jangka masa yang lebih lama daripada yang disyorkan.

Jika mengambil ubat-ubatan lain
Beritahu doktor atau pegawai farmasi anda jika anda mengambil atau telah baru-baru ini mengambil sebarang ubat-ubatan lain termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi. Perhatian harus diambil jika gluco-S1500 Serbuk untuk larutan oral digabungkan dengan ubat-ubatan seperti warfarin, tetracycline dan perubatan anti-diabetes oral.

Cara penggunaan Serbuk GLUCO-S1500

Berapa banyak harus diambil

Ambil kandungan satu sachet (dilarutkan dalam segelas air) sekali sehari.

Bila perlu diambil

Ambil Serbuk GLUCO-S1500 baiknya selepas makan.

Berapa lama perlu diambil

Glucosamine tidak ditandakan untuk merawat gejala sakit akut. Kelegaan gejala-gejala (terutamanya kelegaan gejala kesakitan) mungkin tidak dialami sehingga selepas beberapa minggu rawatan dan dalam beberapa kes masa yang lebih lama diperlukan. Sekiranya tiada kelegaan gejala-gejala yang dialami selepas 2 hingga 3 bulan, rawatan berterusan dengan Glucosamine harus dinilai semula.

Jika terlupa mengambil

Ambil dos seterusnya seperti yang dirancang. Jangan ambil dos yang

berganda untuk mengganti balik dos yang terlupa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil lebih gluco-S1500 Serbuk untuk larutan oral daripada yang seharusnya, anda perlu berjumpa dengan doktor, pegawai farmasi atau hospital.

Semasa menggunakan Serbuk GLUCO-S1500

Perkara yang perlu dilakukan

Tanya doktor atau pegawai farmasi mengenai penggunaan Serbuk GLUCO-S1500 jika anda mempunyai:

- penyakit kencing manis (pemantauan yang lebih kerap tentang paras gula darah mungkin diperlukan apabila memulakan rawatan dengan Glucosamine.)
- penyakit asma, anda harus sedar tentang potensi tentang gejala yang semakin teruk apabila memulakan rawatan dengan Glucosamine.
- penyakit hati yang teruk atau masalah buah pinggang.

Perkara yang tidak boleh dilakukan
Serbuk GLUCO-S1500 tidak boleh digunakan semasa mengandung dan menyusuan. Tanya doktor atau pegawai farmasi sebelum mengambil sebarang ubat-ubatan.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Tiada kajian mengenai kesan pada keupayaan untuk memandu dan menggunakan mesin telah dijalankan. Jika anda mengalami pening atau mengantuk ketika mengambil gluco-S1500 Serbuk untuk larutan oral, anda tidak boleh memandu atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, gluco-S1500 Serbuk untuk larutan oral boleh mempunyai kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Berikut adalah

dilaporkan:

- Biasa ($\geq 1/100$ hingga $<1/10$): sakit kepala, keletihan, loya, sakit perut, senak, cirit-birit, sembelit.
- Luar biasa ($\geq 1/1000$ hingga $<1/100$): ruam, gatal-gatal, curahan.

Jika sebarang kesan sampingan menjadi semakin serius, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, beritahu doktor atau pegawai farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers → Reporting).

Cara penyimpanan dan pelupusan

Serbuk GLUCO-S1500

Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C dan jauhkan daripada kanak-kanak.

Pelupusan

Lupuskan selepas tarikh luput pada produk.

Sila rujuk ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan.

Maklumat Lanjut

Rupa dan warna produk

Gluco-S1500 Serbuk untuk Larutan oral adalah putih ke luar putih serbuk granular yang terkandung di dalam sachet satu dos.

Pek Saiz: 30 sachet.

Bahan-bahan kandungan

Satu paket mengandungi kristal Glucosamine sulfat 1884mg setara dengan 1500mg Glucosamine sulfat.

Bahan-bahan lain adalah: sorbitol, polyethylene glycol 4000, asid sitrik dan aspartame.

MAL08082494XC

Pengilang

China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd.

182-1, Keng Tze Kou, Hsinfong, Hsinchu, Taiwan, R.O.C.

Pemegang Pendaftaran Produk

Apex Pharmacy Marketing Sdn Bhd
No. 2, Jalan SS13/5, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan

Tarikh kemaskini RiMUP

29 Mei 2013