

HYDROCHLORZIDE TABLET

Hydrochlorothiazide (25mg, 50mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

- Apakah kegunaan Hydrochlorzide
- Bagaimana Hydrochlorzide berfungsi
- Sebelum mengambil Hydrochlorzide
- Cara menggunakan Hydrochlorzide
- Semasa mengambil Hydrochlorzide
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan dan pelupusan Hydrochlorzide
- Maklumat lanjut
- Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
- Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Hydrochlorzide

Ia digunakan untuk merawat retensi bendalir (edema) dan tekanan darah tinggi (hipertensi).

Bagaimana Hydrochlorzide berfungsi

Hydrochlorothiazide tergolong dalam kumpulan thiazide diuretik yang bertindak secara langsung pada ginjal bagi meningkatkan perkumuhan air, di mana ini akan mengurangkan isipadu darah serta tekanan pada salur darah.

Sebelum mengambil Hydrochlorzide

Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika anda:

- alahan (hipersensitif) terhadap hydrochlorothiazide, terbitan-sulfonamide yang lain atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- pernah mengalami ketidaaan air kencing (anuria).

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- mempunyai kerosakan hati atau ginjal.
- mengetahui anda mempunyai paras elektrolit (kalium, natrium, klorida, magnesium) rendah dan dehidrasi.
- mempunyai gout dan / atau kencing manis.
- mempunyai gangguan sistem pertahanan badan sendiri (SLE, *Systemic lupus erythematosus*).
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

Jika mengambil lain-lain ubat

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil alkohol, barbiturate, narkotik, dadah antidiabetik, dadah hypertensi, kortikosteroid, ACTH, litium juga termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

Cara mengambil Hydrochlorzide

Berapa banyak harus diambil

Dewasa

- Edema: 25 mg hingga 100 mg sekali atau dua kali sehari. Maksimum dos adalah 200mg sehari.
- Tekanan Darah Tinggi: 25 mg hingga 50 mg setiap hari. Maksimum dos adalah 100 mg sehari.

Kanak-kanak

2.5mg/kg/hari, dibahagikan kepada dua dos berasingan dalam sehari.

Bila perlu diambil

Hendaklah diambil mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu diambil

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

Jika anda terlupa mengambil

Ambil secepat mungkin apabila anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Maklumat khusus berkenaan pengambilan berlebihan tidak didapati. Namun, sebarang ubat yang diambil secara berlebihan akan membawa kesan yang serius. Jika anda terambil secara berlebihan, hubungi doktor atau ahli farmasi dengan segera.

Semasa mengambil Hydrochlorzide

Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil tablet. Makan tablet bersama air dan cuba mengambilnya pada waktu yang sama setiap hari.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengunyah tablet. Telan tablet dengan air. Jangan mengambil ubat ini dengan sendiri tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika:

- mempunyai masalah hati atau ginjal.
- mempunyai gout dan / atau kencing manis.
- alahan kepada mana-mana bahan dalam ubat ini.

- mempunyai gangguan sistem pertahanan badan sendiri (SLE, *systemic lupus erythematosus*).
- mengetahui anda mempunyai paras elektrolit (kalium, natrium, klorida, magnesium) rendah dan dehidrasi.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

Kesan-kesan sampingan

- Sakit perut, muntah, mual, cirit-birit, sembelit.
- Pening, sakit kepala.
- Sesemut dan tusukan.
- Tekanan darah yang rendah.
- Paras gula darah yang tinggi.
- Ketidakseimbangan elektrolit.
- Profil sel darah yang tidak normal.
- Ruam kulit dan gatal-gatal.

Dapatkan rawatan perubatan secepat mungkin jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers → Reporting*).

Cara penyimpanan dan Pelupusan Hydrochlorzide

Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

Rupa dan warna produk

Hydrochlorzide-25 Tablet

Tablet oren terang, berbentuk bulat rata dengan ukiran ‘XS’ dan garis tengah pada satu belah dan tanpa garis pada sebelah yang lain, berdiameter 7.9mm. Didapat dalam bentuk blister strips 10’s di dalam kotak bungkus 30 tablet.

Hydrochlorzide-50 Tablet

Tablet berwarna oren, berbentuk bulat rata dengan ukiran ‘XS’ dan garis tengah pada

HYDROCHLORZIDE TABLET

Hydrochlorothiazide (25mg, 50mg)

satu belah dan tanpa garis pada sebelah yang lain, berdiameter 7.9mm.

Didapati dalam bentuk blister strips 10's di dalam kotak bungkus 30 tablet dan 100 tablet.

Bahan-bahan kandungan

Hydrochlorzide-25 Tablet

Bahan aktif:

Hydrochlorothiazide 25mg.

Bahan tidak aktif:

Maize Stach, Polyvinylpirrolidone, Magnesium Stearate, Dioctyl Sodium Sulphosuccinate, Purified Water, Colloidal Silicone Dioxide, Isopropyl Alcohol, Lactose, FDC Yellow Colour.

Hydrochlorzide-50 Tablet

Bahan aktif:

Hydrochlorothiazide 50mg

Bahan tidak aktif:

Maize Stach, Polyvinylpirrolidone, Magnesium Stearate, Dioctyl Sodium Sulphosuccinate, Purified Water, Colloidal Silicone Dioxide, Isopropyl Alcohol, Lactose, Sunset Yellow, Ponceau 4R Colour.

Nombor MAL

Hydrochlorzide-25 Tablet:

MAL19860190A

Hydrochlorzide-50 Tablet:

MAL19860189A

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran

Produk

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd

1-5 Cheng Industrial Estate,

75250 Melaka,

Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP:

03/01/2014