

MAPRESS TABLET

Haloperidol (0.5mg, 1.5mg, 5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini?	Bagaimana berfungsi MAPRESS	MAPRESS	<ul style="list-style-type: none">• <i>Comatose states</i> (koma, tidak sedarkan diri)• Kemurungan (kerana alkohol atau dadah berlebihan)• Penyakit <i>Parkinson</i> <p>Jika anda tidak pasti sama ada anda mengalami sebarang keadaan di atas, tanya doktor anda.</p>
1. Apakah kegunaan MAPRESS 2. Bagaimana berfungsi MAPRESS 3. Sebelum mengambil MAPRESS 4. Cara menggunakan MAPRESS 5. Semasa menggunakan MAPRESS 6. Kesan-kesan sampingan 7. Cara penyimpanan dan pelupusan MAPRESS 8. Maklumat lanjut 9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk 10. Tarikh kemaskini RIMUP	MAPRESS mengandungi bahan aktif haloperidol. Haloperidol tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai antipsikotik. Ubat ini mengawal bahan kimia dalam otak, yang menyebabkan penyakit mental. Ia menghalang transmisi dalam otak.	Hubungi doktor anda sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan tentang tujuan MAPRESS dibekalkan kepada anda. Doktor anda mungkin membekalkan MAPRESS untuk tujuan lain.	MAPRESS tidak digalakkan penggunaannya di kalangan kanak-kanak umur bawah 3 tahun.
Apakah kegunaan MAPRESS Ubat ini digunakan untuk merawat penyakit mental seperti: <ul style="list-style-type: none">• skizofrenia (penyakit dengan gangguan emosi dan tingkah laku)• <i>psychosis</i> disebabkan oleh kerosakan otak atau kelemahan mental• <i>senile psychosis</i> (gangguan mental disebabkan faktor usia)• <i>mania</i>• <i>Gilles de Tourette syndrome</i> (keadaan yang menyebabkan seseorang itu membuat pergerakan atau bunyi dengan cepat di luar kawalan)• khayalan, halusinasi, kekeliruan, kegeletaran dan agresif• loya dan muntah (disebabkan rawatan kanser)	Ubat ini hanya boleh diperolehi melalui preskripsi doktor.	Sebelum mengambil MAPRESS <u>Bila tidak boleh mengambil</u> Jangan mengambil ubat ini jika anda mempunyai alahan terhadap: <ul style="list-style-type: none">• <i>haloperidol</i>• sebarang bahan lain yang disenaraikan di hujung risalah ini	Jangan mengambil MAPRESS selepas tarikh luput pada pek ini atau jika terdapat tanda salahguna pada pembungkusan. Jika ia sudah luput atau rosak, kembalikan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.
	Sesetengah simptom-simptom alergi termasuklah: <ul style="list-style-type: none">• sesak nafas, berdehit atau sukar bernafas• Bengkak pada muka, bibir, lidah atau bahagian badan lain• ruam kulit, gatal-gatal atau bintik-bintik merah pada kulit.	 <u>Sebelum mula mengambil</u> Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan terhadap sebarang ubat, makanan, pengawet atau pewarna.	Beritahu doktor anda jika anda mempunyai atau pernah mengalami sebarang masalah kesihatan seperti yang berikut: <ul style="list-style-type: none">• masalah jantung dan salur darah• penyakit hati• epilepsi• <i>thyrotoxicosis</i> (berlebihan hormon tiroid dalam badan)
	Jangan mengambil MAPRESS jika anda mempunyai atau pernah mengalami sebarang masalah keasihan seperti yang berikut: <ul style="list-style-type: none">• <i>Brain damage</i> (kerosakan otak)		Beritahu doktor anda jika anda hamil atau bercadang untuk hamil atau anda menyusukan bayi. Ia tidak digalakkan penggunaannya semasa kehamilan dan menyusukan

bayi. Doktor anda akan berbincang dengan anda mengenai risiko dan manfaat mengambil ubat ini.

Jika anda belum memberitahu doktor anda tentang mana-mana perkara di atas, beritahunya sebelum anda mula mengambil MAPRESS.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuklah sebarang ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan MAPRESS boleh bertindak balas antara satu sama lain.

Ini termasuklah:

- ubat tahan sakit
- *benzodiazepine*
- antikonvulsan, ubat yang digunakan untuk mengawal epilepsi
- ubat yang digunakan untuk mengawal kemurungan
- ubat antipsikotik yang digunakan untuk merawat penyakit mental
- ubat untuk darah tinggi dan masalah jantung
- ubat untuk merawat penyakit *Parkinson*
- adrenalin, ubat yang digunakan semasa kecemasan
- *anticoagulants* (mengurangkan risiko darah beku)

Ubat-ubat ini mungkin dipengaruhi oleh MAPRESS atau mungkin menjelaskan fungsinya. Anda mungkin perlu mengambil ubat anda dalam jumlah yang berlainan atau anda mungkin perlu mengambil ubat yang berlainan.

Doktor atau ahli farmasi anda mempunyai lebih banyak maklumat tentang ubat-ubat yang perlu diberi perhatian

semasa mengambil MAPRESS atau yang perlu dielakkan.

Cara menggunakan MAPRESS

Patuhilah semua arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Arahannya ini mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini.

Sekiranya anda tidak faham arahan pada pek ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan memberitahu anda berapa banyak pil yang perlu diambil setiap hari. Ini bergantung kepada umur, keadaan anda dan sama ada anda mengambil sebarang ubat lain.

Dewasa

Simptom yang sederhana:
1 - 5mg setiap hari

Simptom yang serius:
5 - 15mg setiap hari, sehingga 100mg sehari.

Orang tua dan pesakit yang lemah

1 - 3mg setiap hari

Kanak-kanak

Dos permulaan: 1-3mg sehari
Dos kawalan: 0.05mg setiap kg berat badan sehari.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti dos yang betul untuk anda. Mereka akan memberitahu anda kuantiti yang perlu diambil.

Patuhilah semua arahan yang diberikan kepada anda. Jika anda mengambil dos yang salah, MAPRESS tidak akan berfungsi dengan baik dan masalah anda tidak akan pulih.

Bila perlu digunakan

Ambil ubat ini pada masa yang sama setiap hari.

Mengambil ubat pada masa yang sama setiap hari akan memberi kesan terbaik. Ini juga membantu anda mengingati masa untuk mengambil ubat.

Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil MAPRESS selagi diarahkan oleh doktor anda.

Ubat ini membantu mengawal keadaan anda. Oleh itu, anda mesti mengambil ubat ini setiap hari.

Jangan berhenti mangambil ubat anda atau mengurangkan dos tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat dan kemudian kembali mengambil ubat anda seperti biasa.

Jika sudah dekat waktu dos seterusnya, tinggalkan dos yang terlupa dan ambil dos seterusnya mengikut jadual biasa.

Jangan gandakan dos untuk menggantikan dos yang terlupa dengan mengambil lebih daripada satu dos pada masa yang sama. Ini mungkin meningkatkan peluang anda mendapat kesan sampingan.

Jika anda tidak pasti apa yang perlu dilakukan, hubungi doktor atau ahli farmasi anda.

Jika anda mempunyai masalah untuk mengingat masa pengambilan ubat, tanya ahli farmasi anda untuk dapatkan petua.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda fikir anda atau orang lain mungkin terlebih mengambil MAPRESS, hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat atau pergi ke bahagian kecemasan

hospital yang terdekat dengan segera.

Ini mesti dilakukan walaupun tiada tanda ketidaksesuaian atau keracunan.

Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera.

Simptom-simptom terlebih dos termasuklah hipotensi (tekanan darah rendah), penglihatan kabur, kekeliruan, mengantuk, kelemahan dan ketegangan otot atau kegeletaran, kesukaran bernafas, degupan jantung yang cepat dan tidak sekata.

Semasa menggunakan MAPRESS

Perkara yang perlu dilakukan
Sentiasa mematuhi arahan doktor anda dengan teliti.

Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, beritahu doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil MAPRESS.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

Beritahu doktor anda dengan segera jika mendapati sebarang pergerakan tidak terkawal pada lidah, mulut, pipi atau dagu, yang akan merebak ke lengan dan kaki.

Simptom-simptom ini dikenali sebagai *tardive dyskinesia*, yang mungkin dialami oleh pesakit yang mengambil ubat antipsikotik, termasuk MAPRESS.

Kedaaan ini lebih kerap berlaku jika menerima rawatan ubat ini untuk jangka masa panjang, terutamanya di kalangan wanita yang berusia.

Jika anda akan menjalani pembedahan yang memerlukan ubat bius am, beritahu doktor

atau doktor gigi anda bahawa anda sedang mengambil ubat MAPRESS.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mangambil ubat anda atau mengurangkan dos tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jika anda tiba-tiba berhenti mengambil MAPRESS, keadaan anda akan bertambah teruk atau peluang anda mendapat kesan sampingan yang tidak diingini akan meningkat.

Jangan mengambil sebarang ubat lain yang boleh menyebabkan rasa mengantuk semasa anda mengambil MAPRESS, melainkan disyorkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil MAPRESS untuk merawat sebarang masalah lain melainkan diarah oleh doktor anda.

Jangan beri ubat anda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana MAPRESS mempengaruhi anda.

Seperti ubat antipsikotik yang lain, MAPRESS mungkin menyebabkan rasa pening, gayang, keletihan dan rasa mengantuk di kalangan sesetengah orang.

Pastikan anda tahu bagaimana anda bertindak balas terhadap MAPRESS sebelum anda memandu kereta, mengendalikan mesin atau melakukan perkara lain yang boleh membahayakan jika anda pening atau gayang. Jika ini berlaku, jangan memandu.

Jika MAPRESS menyebabkan anda rasa gayang, pening atau pitam, bangun dari posisi duduk atau baring dengan perlahan-lahan.

Berdiri dengan perlahan-lahan, terutamanya apabila anda bangun dari katil atau kerusi. Ini akan membantu badan anda menyesuaikan diri dengan perubahan posisi dan tekanan darah.

Berhati-hati jika minum alkohol semasa mengambil MAPRESS.

Gabungan MAPRESS dan alkohol akan menyebabkan anda rasa lebih mengantuk, pening atau gayang. Doktor anda mungkin akan mencadangkan anda untuk mengelakkan alkohol semasa anda dirawat dengan MAPRESS.

Kesan-sesan sampingan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda rasa tidak sihat selepas mengambil MAPRESS. Semua ubat boleh membawa kesan sampingan. Kadang kala kesan sampingan ini serius, tetapi selalunya tidak. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan jika anda mengalami sesetengah kesan sampingan.

Jangan khuatir dengan senarai kesan sampingan ini. Anda mungkin tidak mengalami sebarang kesan sampingan tersebut.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai sebarang persoalan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami sebarang kesan sampingan berikut yang membimbangkan anda:

- rasa mengantuk atau keletihan
- kekeliruan

- sakit kepala
- susah tidur
- kelemahan otot
- sukar bertutur dan/atau menelan
- mulut kering
- senak perut
- rasa loya dan/atau muntah-muntah
- sembelit
- penglihatan kabur atau sukar menumpu
- bengkak pada tangan, kaki dan/atau buku lali

Beritahu doktor anda jika anda mendapati apa-apa yang membuatkan anda rasa tidak sihat. Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin berlaku di kalangan sesetengah pesakit.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, or atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers → Reporting*).

Cara penyimpanan dan pelupusan MAPRESS

Penyimpanan

Simpan ubat anda dalam peknya. Jika anda mengeluarkan ubat daripada pek, ia mungkin tidak dapat dikekalkan dalam keadaan yang baik.

Simpan ubat anda di tempat yang sejuk dan kering pada suhu bawah 25°C. Lindungi daripada cahaya.

Jangan simpan MAPRESS atau ubat lain dalam bilik mandi atau dekat sinki. Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta atau atas unjuran tapak tingkap. Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter dari aras lantai ialah tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat.

Pelupusan

Jika doktor anda mengarahkan anda berhenti mengambil MAPRESS atau ubat ini sudah melepassi tarikh luputnya, sila tanya ahli farmasi anda apa yang patut dilakukan dengan sebarang ubat yang tinggal.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

MAPRESS Tablet 0.5mg

- Pil bulat berdiameter 7mm, berwarna epal hijau dengan tanda 'Star' dan 'd'.

MAPRESS Tablet 1.5mg

- Pil bulat berdiameter 7mm, berwarna biru dengan tanda 'Star' dan 'd'.

MAPRESS Tablet 5mg

- Pil bulat berdiameter 7mm, berwarna kuning dengan tanda 'Star' dan 'd'.

Bahan-bahan

kandungan Bahan aktif:

- *haloperidol*

Bahan tidak aktif:

MAPRESS Tablet 0.5mg

- *aerosil*
- pewarna kuning
- tepung jagung
- *polyvinylpyrrolidone*
- *magnesium stearate*
- *promigel*
- pewarna biru
- laktosa

MAPRESS Tablet 1.5mg

- *aerosil*
- tepung jagung
- *polyvinylpyrrolidone*
- *magnesium stearate*

- *promigel*
- pewarna biru
- laktosa

MAPPRESS Tablet 5mg

- *aerosil*
- tepung jagung
- *polyvinylpyrrolidone*
- *magnesium stearate*
- *promigel*
- pewarna kuning
- laktosa

Nombor MAL

MAPPRESS Tablet 0.5mg
MAL19950598A

MAPPRESS Tablet 1.5mg
MAL19950599A

MAPPRESS Tablet 5mg
MAL19950600A

Pengilang

DUOPHARMA (M) SDN BHD
Lot 2599, Jalan Seruling 59,
Kaw 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang, Selangor,
Malaysia.

Pemegang Produk Pendaftaran Produk

DUOPHARMA (M) SDN BHD
Lot 2599, Jalan Seruling 59,
Kaw 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RIMUP
03/09/2014

Nombor siri:
BPFK (R4/1) 030914/00006