

TICLID®

Ticlopidine 250mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Ticlid
2. Bagaimana Ticlid berfungsi
3. Sebelum mengambil Ticlid
4. Cara menggunakan Ticlid
5. Semasa menggunakan Ticlid
6. Kesan-sampangan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ticlid
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Ticlid

Ticlid digunakan untuk:

- Mengelakkan aliran darah yang normal ke jantung selepas pembedahan pintasan jantung.
- Mengelakkan patensi saluran darah bagi pesakit menjalani rawatan hemodialisis untuk jangka panjang.
- Mencegah pembentukan darah beku berikutan dengan tindakan intervensi jantung (pemasangan stent) dengan kombinasi ubat-ubat antiplatelet lain seperti *aspirin*.
- Mengurangkan risiko strok di kalangan pesakit yang telah mengalami gejala strok dan strok ulangan bagi pesakit yang telah mengalami strok pada masa lalu. Ticlid boleh menyebabkan masalah darah yang boleh mengancamkan nyawa pesakit. Oleh itu, Ticlid hanya dikhaskan untuk pesakit yang tidak boleh bertoleransi atau alah terhadap rawatan *aspirin* atau gagal dalam rawatan *aspirin*.

Bagaimana Ticlid berfungsi

Ticlid mengandungi ticlopidine yang digunakan sebagai bahan aktif. Ia tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai agen antiplatelet. Ia berfungsi dengan mengurangkan keupayaan sel-sel darah beku (platelet) untuk bergumpal antara satu sama lain dan dinding saluran darah. Ini akan mengurangkan keupayaan pembentukan darah beku di tempat-tempat yang tidak diingini seperti di dalam saluran darah yang sempit.

Sebelum mengambil Ticlid

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Ticlid jika:

- Anda alah (hipersensitif) terhadap *Ticlopidine* dan / atau mana-mana bahan-bahan lain Ticlid (yang disenaraikan di bahagian 8 di bawah)
- Anda mempunyai masalah darah pada masa lalu (bilangan sel darah putih yang rendah atau bilangan platelet yang rendah)
- Anda mempunyai apa-apa penyakit darah yang menyebabkan masa pendarahan yang panjang
- Anda mempunyai masalah pendarahan yang aktif seperti ulser perut atau pendarahan dalam otak disebabkan oleh pemecahan saluran darah.
- Anda mempunyai kecenderungan pendarahan spontan yang serius (*bleeding diathesis*)

Jangan ambil ubat jika mana-mana di atas berkenaan dengan anda. Jika anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Ticlid.

Sebelum mula mengambil

Sila prihatin dan bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika:

- Anda akan menjalani pembedahan
- Anda mempunyai risiko perdarahan yang tinggi
- Anda sedang mengambil antikoagulan atau perencat penggumpalan platelet seperti *aspirin* dan ubat anti radang bukan steroid. Walau bagaimanapun, bagi pesakit yang mempunyai stent pada jantung, *ticlopidine* akan diambil bersama-sama dengan *aspirin* (100-325mg/sehari) untuk tempoh selama sebulan selepas implantasi stent.
- Anda mempunyai masalah hati.

Ticlid boleh menyebabkan beberapa masalah berkaitan dengan darah, hati dan beberapa reaksi alahan yang serius. (merujuk kesan sampingan)

Doktor anda akan menjalankan ujian darah sebelum anda mula mengambil Ticlid dan setiap dua minggu selama tiga bulan yang pertama dalam rawatan anda untuk memeriksa bilangan sel-sel darah anda termasuk bilangan platelet.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Jangan mengambil ubat ini dan beritahu doktor anda jika anda mengambil:

- *Acetylsalicylic acid* juga dikenali sebagai *aspirin*, digunakan untuk melegakan kesakitan, demam, keradangan dan mencegah pembentukan darah beku.

Ubat-ubatan berikut perlu penjagaan khas untuk digunakan dalam kombinasi dengan Ticlid:

- *Ciclosporin*-digunakan untuk membantu menghalang penolakan pemindahan organ
- *Phenytoin* dan *fosphenytoin*-digunakan untuk merawat epilepsi
- *Theophylline* dan *aminophylline*-digunakan untuk merawat nafas berdehit dan penyakit-penyakit lain berkaitan dengan kesukaran bernafas.

Ubat-ubatan berikut boleh meningkatkan peluang anda untuk mendapat kesan sampingan apabila diambil dalam kombinasi dengan Ticlid:

- Antikoagulan oral
- *Heparin*-digunakan sebagai antikoagulan
- *Thrombolytics*-digunakan untuk mencegah pembekuan darah.

Sebagai langkah berwaspada, jangan mengambil Ticlid semasa mengandung dan menyusui bayi.

Cara menggunakan Ticlid

Sentiasa mengambil Ticlid tepat seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

- Menelan tablet anda secara oral dengan segelas air.
- Ubat ini perlu diambil selepas makan.

Berapa banyak harus digunakan

Dewasa

- Dos biasanya untuk semua tanda-tanda penyakit ialah 1 tablet (250mg) 2 kali sehari.

Bila perlu digunakan

Guna Ticlid pada masa yang sama setiap hari melainkan jika doktor anda memberitahu anda sebaliknya. Mengambil ubat anda pada masa yang sama setiap hari akan mempunyai kesan yang terbaik. Ia juga akan membantu anda ingat bila untuk mengambil ubat.

Jika anda tidak pasti bila ubat perlu diambil, minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

Teruskan pengambilan ubat anda selagi doktor anda memberitahu anda supaya untuk meneruskan.

Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa satu dos, mengambil sebaik sahaja anda ingat. Walau bagaimanapun, jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang terlepas. Jangan cuba untuk mengganti dos terlepas dengan mengambil lebih daripada satu dos pada satu-satu masa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil terlebih pil, hubungi doktor anda atau jabatan kecemasan hospital yang terdekat dengan segera. Ambil pek ubat dengan anda. Ketidakselesaan gastro usus yang serius mungkin akan berlaku.

Semasa menggunakan Ticlid

Perkara yang perlu dilakukan

- Maklumkan kepada doktor anda dengan segera jika anda mengalami demam, sakit tekak atau mulut luka dan / pendarahan berpanjangan atau luar biasa, najis kehitaman/ berdarah , air kencing gelap, najis berwarna terang dan demam kuning.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda sedang mengandung atau mengandung semasa rawatan anda.
- Ticlid boleh didapati dalam susu ibu. Sila beritahu doktor anda jika anda sedang menyusukan bayi.

- Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang sebarang aspek perubatan anda, atau sebarang pertanyaan mengenai maklumat di dalam risalah ini, membincangannya dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- **Jangan memberikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.**
- **Jangan gunakan ubat ini untuk merawat sebarang aduan lain melainkan jika doktor anda memberitahu anda.**
- **Jangan berhenti mengambil Ticlid, atau menukar dos, tanpa memeriksa dengan doktor anda.**

Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Anda boleh memandu atau menggunakan mana-mana alat atau mesin. Jika anda terjejas oleh kesan sampingan yang berikut, **jangan memandu atau menggunakan mesin**.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat-ubatan mempunyai beberapa kesan sampingan yang tidak diingini tetapi bukan semua orang akan mengalaminya.

Jangan terkejut dengan kesan-kesan sampingan yang mungkin dialami dalam senarai ini.

Anda kemungkinan besar tidak akan mengalami apa-apa daripada mereka.

Antara kesan sampingan yang mungkin dilaporkan adalah:

- Pengurangan bilangan sel-sel darah putih (*neutropenia*)
- Cirit-birit, rasa loya
- Pendarahan semasa dan selepas pembedahan
- Ruam kulit (*urticaria* atau *maculopapular*) sering disertakan dengan gatal-gatal
- Peningkatan dalam beberapa keputusan ujian hati (semasa 4 bulan pertama rawatan Ticlid)
- Peningkatan tahap lemak dalam darah (kolesterol dan *triglycerides* selepas 1-4 bulan rawatan tanpa peningkatan selepasnya)
- Pengurangan dalam bilangan platelet

darah (*thrombocytopenia*); pengurangan dalam bilangan semua sel-sel darah (*pancytopenia*); pengurangan dalam pengeluaran sel-sel darah oleh sum-sum tulang (*bone marrow aplasia*)

- Sejenis gangguan darah yang disebabkan oleh pembentukan darah beku di seluruh badan dalam saluran darah yang sempit (*thrombotic thrombocytopenic purpura*)

Kesan sampingan yang sangat jarang berlaku

- Cirit-birit yang serius bersama-sama dengan keradangan usus besar (*lymphocytic colitis*)
- Reaksi kulit serius yang kadang-kala boleh mengancam nyawa (*erythema multiforme*)
- Peningkatan dalam beberapa keputusan hati yang boleh berkembang menjadi keadaan yang serius seperti *cytolytic* dan *cholestatic hepatitis*.
- Keradangan dalam saluran darah yang kecil (*Vasculitis*)
- Reaksi alahan kulit yang serius (*anaphylactic reactions, angioedema*)
- Sakit otot dan sendi, ruam (*Lupus syndrome*)

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda perasan apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers → Reporting*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Ticlid

Penyimpanan

- Simpan ubat ini di tempat yang selamat di mana kanak-kanak tidak dapat melihat atau sampai.
- Jangan menggunakan Ticlid selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan pada label dan karton. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.
- Simpan di tempat yang suhunya di bawah 30 °C.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Nombor Siri

BPFK(R4/1)100915/00315

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem ini boleh didapati dalam warna putih ke hampir-putih, bersize bulat dan *biconvex*. Mereka dibekalkan dalam 20 tablet bersalut filem dalam pek lepuh yang mengandungi 10 tablet setiapnya.

Bahan-bahan kandungan:

- Bahan aktif ialah 250mg *ticlopidine hydrochloride*.
- Bahan-bahan lain adalah *microcrystalline cellulose 90 microns, polyvidone K-30, citric acid anhydrous, stearic acid, magnesium stearate* dan *maize starch*.
- Untuk salutan: *white opadry (titanium dioxide, hydroxypropylmethyl cellulose, dan polyethyleneglycol 8000)*

Nombor MAL:

Ticlid tablet 250mg:

MAL19930512AR

Pengilang dan pemegang pendaftaran produk

Pengilang

Sanofi-Aventis S.A.,
Ctra.C-35 (La Batlloria a Hostalric),
KM63.0, Riells, Spain.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sanofi-aventis (Malaysia) Sdn. Bhd.
Unit TB-18-1,
Level 18-1, Tower B, Plaza 33
No.1 Jalan Kemajuan,
Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah ini disediakan pada 11 Sep 2015 (rujukan SmPC Jan 2009).