

AXCEL ERYTHROMYCIN ES-400 SUSPENSION

Erythromycin (400mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Axcel Erythromycin ES-400 Suspension.
 2. Bagaimana Axcel Erythromycin ES-400 Suspension berfungsi.
 3. Sebelum menggunakan Axcel Erythromycin ES-400 Suspension.
 4. Cara menggunakan Axcel Erythromycin ES-400 Suspension.
 5. Semasa menggunakan Axcel Erythromycin ES-400 suspension.
 6. Kesan-kesan sampingan.
 7. Cara penyimpanan dan pelupusan Axcel Erythromycin ES-400 Suspension.
 8. Maklumat lanjut.
 9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
 10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan Axcel Erythromycin ES-400 Suspension

Axcel Erythromycin ES-400 Suspension digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh organisma tertentu dalam penyakit yang disenaraikan di bawah: jangkitan bahagian atas dan bawah saluran pernafasan, pertussis (*whooping cough*), jangkitan kulit dan tisu lembut, *otitis media*, *erythrasma* (penyakit kulit), *listeriosis*, *diphtheria*, syphilis primer (penyakit kelamin) dan pencegah endocarditis (jangkitan jantung).

Bagaimana Axcel Erythromycin ES-400 Suspension berfungsi

Axcel Erythromycin ES-400 Suspension mengandungi bahan yang dipanggil Erythromycin. Erythromycin adalah sejenis antibiotik daripada kumpulan macrolides. Macrolides membunuh atau merencah pertumbuhan bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Axcel Erythromycin ES-400 Suspension

-Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alah terhadap ubat-ubatan yang mengandungi erythromycin atau antibiotik lain daripada kumpulan macrolide.

Sимптом алергии включает покраснение, зуд или жжение, отек лица, губ, языка или других частей тела, затруднение дыхания, кашель или головная боль.

Если вы чувствуете, что вы аллергичны к определенным веществам, перечисленным в конце этого раздела.

Если у вас есть проблемы с сердцем,

-Sebelum menggunakan Axcel
Erythromycin ES-400 Suspension

Sebelum anda mengambil Axcel Erythromycin ES-400 Suspension anda perlu memaklumkan kepada doktor anda:

- Jika anda alergi pada mana-mana ubat-ubatan.
 - Jika anda mempunyai masalah hati.
 - Jika anda mempunyai sejarah arrhythmias.
 - Jika anda menghidapi *myasthenia gravis*
 - Jika anda menghidapi *pseudomembranous colitis* (keradangan usus besar)
 - Jika anda cirit-birit.
 - Jika anda menghidapi *rhabdomyolysis* (kecederaan otot) atau penyakit buah pinggang
 - Sila rujuk kepada doktor anda sebelum mula menggunakan Axcel Erythromycin ES-400 Suspension jika anda mengandung, sedang berancang untuk mengandung, menyusukan bayi atau berancang menyusukan bayi. Doktor anda akan mempertimbangkan manfaat dan risiko unruk menggunakan Axcel Erythromycin ES-400 Suspension.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan kerana ia akan berinteraksi dengan Axcel Erythromycin ES-400 Suspension seperti:

- Ubat-ubatan yang menyebabkan kecederaan hati atau pendengaran
 - Cimetidine, ubat gastrik
 - Carbamazepine, phenytoin, Valproate, ubat sawan
 - Cyclosporine, ubat yang digunakan selepas pemindahan organ
 - Alfentanil, ubat tahan sakit
 - Cisapride, ubat untuk perut
 - Lovastatin, ubat untuk merendahkan tahap kolestrol
 - Terfenadine, untuk reaksi alergi
 - Theophylline, untuk asma
 - Digoxin, ubat untuk jantung
 - Ergotamine, ubat untuk migrain
 - Midazolam, ubat untuk kebimbangan

Doktor atau ahli farmasi anda mungkin mempunyai maklumat lanjut mengenai ubat-ubatan yang perlu diberi perhatian atau dielakkan semasa mengambil ubat ini.

Cara Menggunakan Axcel Erythromycin ES-400 Suspension

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: 400 mg (5 ml), setiap 6 jam atau 800 mg (10 ml), setiap 12 jam. Dos boleh ditingkatkan sehingga 4g setiap hari mengikut keadaan jangkitan.

Kanak-kanak: 30-50 mg/kg setiap hari dalam dos berbahagi; gandakan dalam iangkitan yang teruk

Kanak-kanak 2 ke 8 tahun: 1 g (12.5 ml) setiap hari dalam dos berbahagi

Bayi dan kanak-kanak berumur sehingga 2 tahun: 500 mg (6.25 ml) setiap hari dalam dos berbahagi.

Arahan untuk campuran:

Goncang botol dengan betul untuk meleraikan granul. Tambahkan sedikit air dahulu untuk mlarutkan granul dan goncang, kemudian tambah air sehingga ke penanda dan gantikan penutup. Goncang botol untuk mencampurkan ubat itu dengan betul.

Iikut semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Mereka mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika

AXCEL ERYTHROMYCIN ES-400 SUSPENSION

Erythromycin (400mg/5ml)

anda tidak memahami arahan pada label, dapatkan bantuan doktor atau ahli farmasi anda.

-Bila perlu digunakan

Doktor anda akan menentukan sekiranya anda perlu mengambil Axcel Erythromycin ES-400.

-Berapa lama perlu digunakan

- Ambil ubat ini seperti yang dicatatkan di dalam risalah ini tanpa melebihi sukatan.
- Ikut saranan dan nasihat dari doktor atau ahli farmasi tentang berapa lama anda perlu mengambil ubat anda.
- Jangan berhenti mengambil Axcel Erythromycin ES-400 Suspension walaupun anda berasa lebih baik selepas beberapa hari kecuali dinasihatkan oleh doktor anda. Jika anda berhenti mengambil ubat anda terlalu awal, kejangkitan anda mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya.

-Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

- Di dalam kes pengambilan yang berlebihan, pesakit perlu berhenti mengambil erythromycin.
- Dinasihatkan supaya hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda mengambil Axcel Erythromycin ES-400 Suspension berlebihan.

Semasa menggunakan Axcel Erythromycin ES-400 Suspension

Perkara yang perlu dilakukan

- Maklumkan doktor anda jika anda perlu mengambil ubat lain.
- Ambil Axcel Erythromycin ES-

400 Suspension mengikut dos yang disarankan.

- Maklumkan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan sampingan yang tidak tersenari di dalam risalah ini.
- Beritahu doktor anda jika simptom anda tidak bertambah baik selepas beberapa hari mengambil Axcel Erythromycin ES-400 Suspension, atau simptom bertambah teruk.
- Beritahu doktor anda jika anda menjadi hamil semasa mengambil Axcel Erythromycin ES-400 Suspension.
- Beritahu doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami cirit-birit yang teruk.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Axcel Erythromycin ES-400 Suspension dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Penggunaan yang lama dan berulang boleh menyebabkan bakteria atau kulat yang tidak sensitif tumbuh dengan mendadak.
- Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana Axcel Erythromycin ES-400 Suspension memberi kesan kepada anda.

Kesan-sesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Axcel Erythromycin ES-400 Suspension boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun tidak semua orang mendapatnya. Anda adalah dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor/ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Kesan-sesan sampingan berikut telah dilaporkan:

- Gangguan *gastrointestinal* seperti ketidakselesaan dan kekejangan perut, rasa loya, muntah-muntah dan cirit-birit.
- *Pseudomembranous colitis* (keradangan pada usus besar), hepatotoksid (menjejaskan fungsi hati), ototoksid (menjejaskan pendengaran).
- Keadaan alergi dari ruam hingga *anaphylaxis* (serius reaksi alahan terhadap bahan asing yang mempengaruhi pelbagai bahagian badan dan boleh mengancam nyawa).
- *Ventricular arrhythmia* (kadar degupan jantung yang tidak normal), termasuk *ventricular tachycardia* (dengupan jantung yang cepat).
- *Agranulocytosis* (penurunan sel-sel darah putih)
- Ketosikan saraf pusat termasuk reaksi psaikotik (contohnya halusinasi) dan mimpi ngeri.
- Sindrom seperti *myasthenia* (kelemahan otot)
- Keradangan pada pankreas.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mennyedari apa-apa yang membuat anda rasa tidak sihat. Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas juga boleh berlaku kepada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers -> Reporting).

Cara penyimpanan dan pelupusan Axcel Erythromycin ES-400 Suspension

-Penyimpanan

Jauhkan Axcel Erythromycin ES-400 Suspension daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup rapat. Simpan pada suhu tidak melebihi 30°C sehingga dilarutkan. Selepas dilarutkan, simpan pada suhu bawah

AXCEL ERYTHROMYCIN ES-400 SUSPENSION

Erythromycin (400mg/5ml)

25°C dan penggunaan dalam tempoh 35 hari. Penyejukan tidak diperlukan.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Axcel Erythromycin ES-400 Suspension adalah ampaian berwarna putih yang sekata dengan perisa pisang apabila dibancuh.

Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif:

Erythromycin Ethylsuccinate

Bahan Tidak Aktif:

Xanthan Gum, Dimethicone, Polysorbate, Icing Sugar, Sodium Saccharin, Sodium Citrate Dihydrate, Povidone, Disodium Hydrogen Phosphate Anhydrous, Aerosil 200 dan Banana Flavor

- Nombor MAL

MAL09082800AZ

Pengilang dan pemegang pendaftaran produk

KOTRA PHARMA (M) SDN BHD
No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12,
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

19/11/2015

Nombor siri

BPFK(R4/1)021115/00393