

ELOMET[®] LOTION

Mometasone Furoate (0.1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ELOMET LOTION
2. Bagaimana ELOMET LOTION berfungsi
3. Sebelum menggunakan ELOMET LOTION
4. Cara menggunakan ELOMET LOTION
5. Semasa menggunakan ELOMET LOTION
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ELOMET LOTION
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan ELOMET LOTION

ELOMET LOTION digunakan untuk mengurangkan keradangan dan kegatalan yang disebabkan oleh keadaan yang tertentu pada kulit, termasuk kulit kepala, yang berkesan dirawat dengan ubat kortikosteroid.

Bagaimana ELOMET LOTION berfungsi

ELOMET LOTION tergolong ke dalam kumpulan ubat kortikosteroid topikal. Mometasone furoate bertindak menentang keradangan, mengurangkan rasa gatal dan menyempitkan salur darah.

Sebelum menggunakan ELOMET LOTION

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan ELOMET LOTION jika anda alah (hipersensitif) terhadap mometasone furoate atau mana-mana bahan lain di dalam ELOMET LOTION ataupun terhadap ubat lain yang serupa dengannya.

Tanya doktor atau ahli farmasi jika anda kurang pasti.

- Sebelum mengambil ELOMET LOTION

Bagi wanita yang hamil atau yang sedang menyusukan anak dengan susu badan

Anda harus beritahu doktor jika anda hamil atau sedang menyusukan anak dengan susu badan, sebelum anda menggunakan ELOMET LOTION.

- Jika menggunakan ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang menggunakan krim, salap atau losen lain ataupun jika anda sedang memakan ubat lain. Ini merangkumi ubat yang anda peroleh tanpa preskripsi di farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan ELOMET LOTION

- Berapa banyak harus digunakan

Gunakan ELOMET LOTION tepat-tepat seperti yang diarahkan oleh doktor. Tanyalah doktor atau ahli farmasi jika anda kurang pasti.

Gosokkan beberapa titis ELOMET LOTION perlahan-lahan ke dalam kawasan kulit yang terjejas, termasuk kulit kepala, sehingga ubat itu diserap.

Penggunaan kortikosteroid pada kanak-kanak hendaklah dihadkan kepada amaan serendah-rendahnya yang dapat memberikan kesan yang diingini.

- Bila perlu digunakan

Sapukan ELOMET LOTION perlahan-lahan sekali sehari.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ELOMET LOTION tepat-tepat seperti yang diarahkan oleh

doktor. Tanya doktor atau ahli farmasi jika anda kurang pasti.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa menggunakan losen ini pada waktu yang sepatutnya, gunakan sebaik sahaja anda ingat, kemudian teruskan seperti biasa.

- Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Anda harus beritahu doktor jika anda menggunakan ELOMET LOTION lebih kerap daripada yang sepatutnya, ataupun pada kawasan kulit yang luas atau untuk terlalu lama, kerana kemungkinan krim ini meresap ke dalam kulit dan kemungkinan berlakunya kesan sampingan akan meningkat dan boleh menjadikan beberapa hormon anda ataupun gula di dalam darah atau air kencing. Kesan-kesan ini lebih mudah berlaku pada bayi dan kanak-kanak kerana mereka mempunyai nisbah keluasan kulit kepada jisim badan yang lebih tinggi. Rawatan jangka panjang boleh melambatkan tumbesaran dan perkembangan mereka.

Semasa menggunakan ELOMET LOTION

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan ELOMET LOTION.

Jika kulit anda menjadi rengsa atau sensitif selepas menggunakan ELOMET LOTION, berhenti menggunakan dan beritahu doktor.

Beritahu doktor jika anda rasa bahawa ELOMET LOTION tidak membantu penyakit anda atau jika penyakit pada kulit anda itu bertambah teruk.

ELOMET® LOTION

Mometasone Furoate (0.1% w/w)

Tanya doktor sebelum menutup bahagian yang dirawat dengan pembalut atau plaster.

Jika anda rasa anda terkena jangkitan pada kulit semasa menggunakan ELOMET LOTION, beritahu doktor kerana doktor mungkin perlu memberi anda ubat lain untuk digunakan.

Beritahu doktor jika anda tidak menggunakan ELOMET LOTION seperti yang telah diarahkan, atas apa-apa sebab.

Jika tidak, doktor mungkin menganggap bahawa ubat ini tidak berkesan dan menukar rawatan anda sedangkan sebenarnya tidak perlu.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan ELOMET LOTION di bawah pembalut luka yang tertutup rapat ataupun pada bahagian kulit yang luas kecuali diarahkan oleh doktor.

Jangan gunakan ELOMET LOTION di dalam mata atau berhampiran mata.

Jangan berikan ELOMET LOTION kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

Jangan gunakan ELOMET LOTION untuk merawat penyakit lain kecuali diarahkan oleh doktor.

Doktor mempreskripsi ELOMET LOTION khususnya untuk merawat penyakit yang anda hidapi ini. Jika anda menggunakan untuk merawat penyakit lain, ubat ini mungkin tidak berkesan ataupun mungkin memburukkan penyakit itu.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan gunakan ELOMET LOTION pada bahagian kulit yang oklusif dan

bergesel seperti pada ketiak atau di lipatan paha kecuali diarahkan oleh doktor.

Jangan gunakan KRIM ELOMET pada muka kecuali diarahkan oleh doktor.

Jika penyakit anda tidak bertambah baik selepas seminggu, beritahu doktor.

Kesan-sesan sampingan

Sama seperti semua ubat lain, ELOMET LOTION boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya.

Beberapa orang mungkin mengalami beberapa kesan sampingan yang berikut selepas menggunakan ELOMET LOTION:

- tindak balas alergi (alaham) pada kulit
- jangkitan sekunder
- jerawat
- radang folikel rambut
- kulit menjadi nipis
- tanda-tanda merah yang berkait dengan ruam panas
- warna kulit menjadi pudar
- rasa pedih
- gatal-gatal
- pertumbuhan rambut yang berlebihan
- kulit menjadi lembut dan menampakkan tanda regang

Kesan sampingan lain yang boleh berlaku apabila menggunakan kortikosteroid topikal ialah kulit menjadi rengsa, kulit menjadi radang disebabkan alahan sentuh, dan ruam di keliling mulut.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda perhatikan kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini, beritahu doktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers → Reporting*)

Cara penyimpanan dan pelupusan ELOMET LOTION

- Penyimpanan

Simpan pada suhu yang kurang daripada 30°C.

Jauhkan daripada kanak-kanak.

Jangan gunakan ELOMET LOTION selepas tarikh tamat tempoh yang tercetak pada bungkusannya.

- Pelupusan

Jangan buang ubat bersama-sama air sisa atau sampah dari rumah. Tanya ahli farmasi tentang cara membuang ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah begini akan membantu memelihara alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

ELOMET LOTION ialah losen yang tidak berwarna ataupun berwarna kuning keputih-putihan. ELOMET LOTION disediakan di dalam botol 30ml.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: Setiap gram ELOMET LOTION mengandungi 1mg mometasone furoate

- Bahan tidak aktif: Isopropyl alcohol, hydroxypropyl cellulose, sodium phosphate monobasic dihydrate, propylene glycol, air yang ditulenkan dan phosphoric acid, jika diperlukan, untuk menyesuaikan pH.

- Nombor MAL:

MAL19940137AZ (Sumber Kanada)

ELOMET® LOTION

Mometasone Furoate (0.1% w/w)

Pengilang:

Sumber Kanada

S-P Canada Inc.,
3535 Trans-Canada,
Pointe-Claire, Québec
Canada, H9R 1B4

Pemegang Pendaftaran Produk

Merck Sharp & Dohme (Malaysia)
Sdn. Bhd.

T2-9, Jaya 33, No. 3 (Lot 33),
Jalan Semangat, Seksyen 13,
46100 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

25/03/2016 (berdasarkan UK PIL
102011)

Nombor siri:

BPFK(R4/1)250316/00097