

# CLAMENTIN FILM COATED TABLET

Amoxycillin /Clavulanic Acid (375mg, 625mg)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan CLAMENTIN F.C TABLET
2. Bagaimana CLAMENTIN F.C TABLET berfungsi.
3. Sebelum menggunakan CLAMENTIN F.C TABLET
4. Cara menggunakan CLAMENTIN F.C TABLET
5. Semasa menggunakan CLAMENTIN F.C TABLET
6. Kesan-sesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan CLAMENTIN F.C TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan CLAMENTIN F.C TABLET

CLAMENTIN F.C TABLET digunakan untuk rawatan jangka masa pendek untuk jangkitan bakteria pada saluran pernafasan, saluran kencing, kulit dan tisu lembut, tulang dan sendi serta pergigian.

Doktor anda mungkin memberikan CLAMENTIN F.C TABLET untuk sebab yang lain. Tanya doktor anda jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengapa CLAMENTIN F.C TABLET diberikan kepada anda.

## Bagaimana CLAMENTIN F.C TABLET berfungsi

CLAMENTIN F.C TABLET mengandungi bahan aktif Amoxycillin/Clavulanic Acid. Ubat ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

## Sebelum menggunakan CLAMENTIN F.C TABLET

### Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan CLAMENTIN F.C TABLET jika:

-anda mempunyai reaksi alahan terhadap penicillin atau jenis antibiotik yang sama (seperti cephalosporins) atau bahan-bahan lain yang terkandung di dalam CLAMENTIN F.C TABLET. Bahan-bahan kandungan disenaraikan di akhir risalah ini. Sesetengah simptom reaksi alahan termasuk ruam kuit, gatal-gatal, kesukaran penafasan dan pembengkakan muka atau lidah.

-anda pernah mengalami masalah hati selepas menggunakan CLAMENTIN F.C TABLET atau antibiotik penicillin yang lain.

### -Sebelum menggunakan CLAMENTIN F.C TABLET

Beritahu doktor anda jika:

- anda pernah mengalami alahan (seperti ruam) terhadap antibiotik seperti penicillin atau sebarang bahan pada masa yang lepas.
- anda alahan terhadap makanan, pewarna, pengawet atau mana-mana ubat yang lain.
- anda pernah mengalami masalah hati selepas menggunakan CLAMENTIN F.C TABLET atau ubat yang lain.
- anda mempunyai demam kelenjar (mononukleosis).
- anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati.

### *Mengandung atau menyusukan anak*

Sila dapatkan nasihat doktor anda sebelum menggunakan CLAMENTIN F.C TABLET jika anda hamil, merancang untuk hamil, menyusukan anak atau berhasrat untuk menyusukan anak. Doktor anda akan mempertimbangkan risiko pengambilan CLAMENTIN F.C TABLET terhadap manfaat yang diharapkan terhadap anda.

CLAMENTIN F.C TABLET 625mg tidak digalakkan untuk penggunaan kanak-kanak 12 tahun dan ke bawah.

### -Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat-ubat yang digunakan bersama CLAMENTIN F.C TABLET mungkin menyebabkan interaksi sesama sendiri. Ini termasuk:

- terapi antikoagulan, ubat untuk kesan penipisan darah.
- pil pencegah kehamilan.
- probencid, ubat untuk gout.
- allopurinol, ubat untuk gout.

Doktor anda atau ahli farmasi mungkin mempunyai maklumat lanjut mengenai ubat-ubatan yang perlu diberi perhatian atau perlu dielakkan semasa mengambil ubat ini.

## Cara menggunakan CLAMENTIN F.C TABLET

### -Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak lebih daripada 12 tahun

### *Ringan - jangkitan sederhana*

: Satu tablet CLAMENTIN F.C TABLET 625mg dua kali sehari.

: Satu tablet CLAMENTIN F.C TABLET 375mg tiga kali sehari.

Doktor anda mungkin memberikan dos yang rendah kepada anda, jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati.

Ikat semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor anda atau ahli farmasi dengan berhati-hati. Ianya mungkin berbeza dengan informasi yang terdapat dalam risalah ini. Jika anda tidak faham mengenai arahan yang terdapat dalam label, sila rujuk doktor anda atau ahli farmasi untuk bantuan.

### -Bila perlu digunakan

Ikat seperti arahan doktor atau ahli farmasi.

### -Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan CLAMENTIN F.C TABLET untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jangan berhenti menggunakan ubat walaupun anda merasa sihat selepas beberapa hari, melainkan jika dinasihatkan oleh doktor anda. Jangkitan anda mungkin tidak sembah sepenuhnya jika anda berhenti menggunakan ubat ini terlalu cepat.

### -Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil dua dos pada masa yang sama.

### -Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital yang terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan tablet yang berlebihan mungkin mengakibatkan sindrom gastrousus dan gangguan kepada keseimbangan bendalir atau elektrolit.

**Semasa menggunakan CLAMENTIN F.C TABLET**

**-Perkara yang perlu dilakukan**

Ikut arahan doktor anda semasa mengambil CLAMENTIN F.C TABLET.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan CLAMENTIN F.C TABLET.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil dan merancang untuk menyusukan anak semasa menggunakan ubat ini.

Dapatkan nasihat doktor anda atau ahli farmasi sebelum menggunakan sebarang ubat.

Jika anda mengalami masalah cirit-birit yang teruk, maklumkan kepada doktor anda atau ahli farmasi dengan segera.

**-Perkara yang tidak boleh dilakukan**

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada orang lain walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

**-Perkara yang perlu diberi perhatian**

*Memandu atau mengendalikan jentera*

Berhati-hati ketika memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana CLAMENTIN F.C TABLET memberi kesan kepada anda.

**Kesan-kesan sampingan**

CLAMENTIN F.C TABLET boleh menyebabkan kesan *sampingan gastrousus* seperti cirit-birit, ketidakhadaman, loya dan muntah. Ia boleh memberi kesan kepada hematologikal (masalah darah) seperti *thrombocytopenia*, *haemolytic anemia*, dan menyebabkan tindak balas hipersensitiviti seperti gatal-gatal dan ruam *erythemasosus*, reaksi alahan yang teruk seperti sindrom *Stevens-Johnson*, *toxic epidermal necrolysis* dan *exfoliative dermatitis*. Ia juga mengakibatkan hiperaktiviti, pening, sakit kepala dan *phlebitis* (keradangan pada urat).

Seperti ubat-ubat yang lain, CLAMENTIN F.C TABLET boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor anda atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang lain selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550 atau laman web [portal.bpfk.gov.my](http://portal.bpfk.gov.my) (*Consumer→ Reporting*).

**Cara penyimpanan dan pelupusan CLAMENTIN F.C TABLET**

**-Penyimpanan**

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan keadaan lembap.


**-Pelupusan**

CLAMENTIN F.C TABLET perlu dilupuskan apabila doktor atau ahli farmasi menyuruh anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila rujuk doktor dan ahli farmasi tentang cara pelupusan ubat yang tidak lagi diperlukan.

**Maklumat lanjut**

**-Rupa dan warna produk**

CLAMENTIN F.C TABLET 375mg:  
Tablet bersalut berwarna putih, satu bahagian bertanda "YSP4"



CLAMENTIN F.C TABLET 625mg:

Tablet elips berwarna putih, dengan satu permukaan bertulis "YSP 3"



**-Bahan-bahan kandungan**

- Bahan aktif:  
Amoxicillin Trihydrate  
Clavulanate Salt
- Bahan tidak aktif:  
Cellulose  
Magnesium Stearate  
Silicon Dioxide  
Sodium Starch Glycolate  
Titanium Dioxide  
Aerosil  
Triethyl Citrate  
Isopropyl Alcohol  
Methylene Chloride

**-Nombor MAL**

CLAMENTIN F.C TABLET 375mg:  
MAL07124623AZ

CLAMENTIN F.C TABLET 625mg:  
MAL07124630AZ

**Pengilang**

Yung Shin Pharmaceutical Ind. Co., Ltd.  
(Taichung Youth Factory III)  
No. 26 Kung Liu Rd. Youth Industrial  
District, Taichia, Taichung, Taiwan,  
R.O.C

**Pemegang Pendaftaran Produk**

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.  
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,  
Kawasan Perindustrian Bandar Baru  
Bangi,  
43000 Kajang, Selangor Darul  
Ehsan,  
Malaysia.

**Tarikh kemaskini RiMUP**

21/4/2016

**Nombor Siri**

BPFK(R4/1)200416/00116