

FUCITHALMIC® VISCOUS EYE-DROPS

Fusidic acid (10mg/g)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Fucithalmic*®
2. Bagaimana *Fucithalmic*® berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Fucithalmic*®
4. Cara menggunakan *Fucithalmic*®
5. Semasa menggunakan *Fucithalmic*®
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Fucithalmic*®
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Fucithalmic*®

Fucithalmic® digunakan untuk jangkitan mata yang disebabkan oleh bakteria dalam konjunktivitis (keradangan putih mata, atau dipanggil sebagai "mata merah"), *blepharitis* (keradangan kelopak mata), *sty* (ketulan di pinggir atas atau bawah kelopak mata), *keratitis* (keradangan kornea, yang merupakan kawasan jelas di tengah-tengah mata), *dacryocystitis* (radang pundi air mata) dan berkaitan dengan penyingkiran bahan asing.

Bagaimana *Fucithalmic*® berfungsi

Fucithalmic® berfungsi dengan membunuh kuman (bakteria) yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan *Fucithalmic*®

- *Bila tidak boleh menggunakan*

*Jangan gunakan *Fucithalmic*®*

• Jika anda alah (hipersensitif) pada asid fusidic, atau mana-mana bahan lain dalam ubat anda. Anda boleh mendapatkan senarai bahan-bahan ini di maklumat lanjut produk dalam risalah ini.

- *Sebelum menggunakan *Fucithalmic*®*

Kehamilan dan menyusukan anak

Sila tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum menggunakan *Fucithalmic*®:

- Jika anda hamil, atau berfikir anda hamil.
- Jika anda menyusukan anak.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil, atau baru-baru mengambil sebarang ubat-ubatan

lain. Ini termasuk sebarang ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi.

Cara menggunakan *Fucithalmic*®

- *Berapa banyak harus digunakan*

Sentiasa gunakan *Fucithalmic*® tepat seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Ubat ini adalah hanya untuk kegunaan mata anda. Jangan telan titisan air. Jangan letakkan titisan air dalam badan anda atau di telinga anda.

Basuh tangan anda sebelum menggunakan *Fucithalmic*®. Jangan gunakan jika meterai penutup pada tiub terbuka. Gambarajah di bawah akan membantu menunjukkan bagaimana untuk menggunakan ubat anda. Ia mungkin berguna untuk melihat dalam cermin.



Hanya mengeluarkan penutup daripada tiub apabila anda sudah bersedia untuk menggunakan ubat. Yang penting adalah hujung tiub tidak menyentuh mata anda.

Dongakkan kepala ke belakang. Tarik kelopak mata anda yang lebih rendah ke bawah perlahan-lahan. Pegang tiub atas mata anda dan tengah atas. Picit satu titisan ke dalam kelopak mata anda yang lebih rendah. Titisan itu akan keluar sebagai titisan pekat. Ia akan menjadi lebih cair dalam mata anda dan anda masih dapat melihat dengan jelas.

Selepas menggunakan ubat anda, anda mungkin akan melihat serbuk putih di sekeliling mata anda. Ini boleh berlaku apabila titisan air menjadi kering. Ia adalah perkara biasa dan tidak

membimbangkan. Anda boleh lap serbuk itu dengan kapas.

Jika ubat itu adalah untuk kanak-kanak, anda boleh menitis air di mata mereka ketika tidur atau berbaring jika ia adalah lebih mudah.

Doktor anda akan memberitahu anda berapa banyak titisan digunakan atau diberikan kepada anak anda. Untuk membantu mengingatkan anda untuk menggunakan ubat, ia boleh digunakan apabila anda melakukan satu lagi tindakan yang tetap, seperti memberus gigi anda.

Orang dewasa, warga tua dan kanak-kanak:

Dos yang biasa adalah satu titisan air dua kali setiap hari, pada waktu pagi dan petang.

- *Bila perlu digunakan*

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Ia adalah sangat penting untuk menggunakan semua ubat yang diarahkan oleh doktor anda. Anda mesti menggunakan ubat anda sekurang-kurangnya 2 hari selepas anda berasa lebih baik dan mata anda kelihatan normal. Anda mesti lakukan ini untuk mengelakkan jangkitan mata daripada kembali berulang.

- *Jika terlupa menggunakan*

Jika anda terlupa untuk menggunakan ubat anda, gunakan ubat sebaik sahaja anda teringat. Kemudian teruskan penggunaan ubat anda pada masa yang biasa. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut tentang pengambilan ubat ini, sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Jika anda secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak titisan dalam mata atau tertelan sedikit titisan air mata, ia tidak akan menyebabkan apa-apa kemudaratan. Jika anda tertelan titisan yang lebih besar kuantitinya atau anda rasa bimbang, hubungi doktor atau

ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat.

Semasa menggunakan *Fucithalmic*[®]

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan memakai apa-apa jenis kanta lekap semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang perlu diberi perhatian *Fucithalmic*[®] mengandungi:

- Benzalkonium klorida. Ini adalah pengawet. Ia boleh menyebabkan kerengsaan mata.

Sila tanya doktor anda jika anda rasa bimbang tentang mana-mana bahan dalam ubat ini.

Memandu dan menggunakan jentera

Selepas penggunaan ubat anda, kekaburan penglihatan mungkin berlaku. Jangan memandu atau menggunakan jentera sehingga penglihatan anda adalah jelas. Semak dengan doktor anda jika anda rasa apa-apa kesan sampingan yang mungkin menghalang anda daripada memandu atau menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Fucithalmic*[®] boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kepedihan mata secara sementara mungkin berlaku. *Fucithalmic*[®] mempunyai potensi alahan yang sangat rendah.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius atau anda perasan apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public* → *Reporting*)

Medicinal Problems / Side Effects / AEFI).

Cara penyimpanan dan pelupusan *Fucithalmic*[®]

- Penyimpanan

- Jauhkan dari jangkauan dan pandangan kanak-kanak.
- Jangan gunakan ubat selepas tarikh tamat tempoh pada kotak itu.
- Jangan simpan tiub selama lebih daripada satu bulan selepas anda mula-mula membukanya.
- Simpan pada suhu bilik terkawal (15° - 25 °C). Pastikan tiub tertutup rapat.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Fucithalmic[®] adalah ampaiian cair berwarna putih hingga krim pucat.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Bahan aktif adalah fusidic acid. *Fucithalmic*[®] mengandungi 10 miligram asid fusidic dalam setiap gram titisan.

- Bahan tidak aktif

- *Benzalkonium chloride*
- *Disodium edetate*
- *Mannitol*
- *Carbomer*
- *Sodium hydroxide*
- Air untuk suntikan.

- Nombor MAL

MAL19913211ACZ

Pengilang

LEO Pharmaceutical Products
Industriparken 55
DK-2750, Ballerup
Denmark.

Pemegang Pendaftaran Produk

DKSH Malaysia Sdn Bhd
B-11-01, The Ascent, Paradigm,
No. 1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor.

Tarikh kemaskini RiMUP

21/02/2017

Nombor Siri:

BPFK(R4/1)200217/00001