

HOEMAL JUNIOR ORAL SUSPENSION

Paracetamol (120mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan HOEMAL JUNIOR?
2. Bagaimana HOEMAL JUNIOR berfungsi?
3. Sebelum mengambil HOEMAL JUNIOR
4. Cara menggunakan HOEMAL JUNIOR
5. Semasa menggunakan HOEMAL JUNIOR
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan HOEMAL JUNIOR
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim tentang HOEMAL JUNIOR. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang tersedia. Ia juga tidak menggantikan tempat ahli farmasi atau doktor anda.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Ahli farmasi atau doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda mengambil HOEMAL JUNIOR berbanding manfaat yang mereka jangka untuk anda.

Jika anda mempunyai sebarang kemasukan tentang pengambilan ubat ini, tanya ahli farmasi atau doktor anda.

Simpan risalah ini bersama ubat.
Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan HOEMAL JUNIOR?

HOEMAL JUNIOR digunakan untuk melegakan sakit yang ringan atau sederhana, termasuk sakit gigi dan simptom deman.

Bagaimana HOEMAL JUNIOR berfungsi?

HOEMAL JUNIOR mengandungi bahan aktif *Paracetamol* yang memberi kesan analgesik (penahan sakit) dan antipiretik (meredakan demam).

Sebelum menggunakan HOEMAL JUNIOR

Bila tidak boleh menggunakan

Sediaan ini mengandungi *Paracetamol*. Jangan mengambil sebarang ubat lain yang mengandungi *Paracetamol* pada masa yang sama.

Jangan mengambil HOEMAL JUNIOR sekiranya anda alah kepada *Paracetamol* atau mana-mana bahan seperti dalam ubat ini.

Sebelum mula menggunakan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mempunyai:

- masalah hati
- masalah ginjal

Kehamilan dan penyusuan:

Beritahu doktor anda sebelum mengambil HOEMAL JUNIOR jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusu bayi.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda sedang mengambil apa-apa produk lain (misalnya ubat yang dibeli tanpa preskripsi doktor, ubat yang dipreskripsikan dan produk-produk herba).

Jika anda sedang menjalani terapi antikoagulan, beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil HOEMAL JUNIOR.

Cara menggunakan HOEMAL JUNIOR

Berapa banyak harus digunakan

10 – 15 mg/kg/dos setiap 4 hingga 6 jam.

3 – 6 bulan:

½ sudu teh (2.5ml), 3-4 kali sehari

6 bulan – 2 tahun:

1 sudu teh (5ml), 3-4 kali sehari

2 - 4 tahun:

1 ½ sudu teh (7.5 ml), 3-4 kali sehari

4 – 6 tahun:

2 sudu teh (10ml), 3-4 kali sehari

Jangan menggunakan melebihi 4 kali dalam 24 jam dan jangan melebihi dos yang dicadangkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Bila perlu digunakan

HOEMAL JUNIOR boleh diambil sebelum atau selepas makan.

Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda mengingatinya. Jangan menggandakan dos untuk menganti dos yang tertinggal.

Jika menggunakan secara berlebihan (terlebih dos)

Simptom pengambilan dos HOEMAL JUNIOR yang berlebihan termasuklah muntah-muntah, sakit perut, tekanan darah rendah dan berpeluh. Ini kerana, pengambilan ubat terlalu banyak boleh menyebabkan kerosakan hati.

Segera telefon doktor anda untuk nasihat atau pergi ke Bahagian Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat, jika anda berfikir bahawa anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak HOEMAL JUNIOR.

Semasa menggunakan HOEMAL JUNIOR

Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan HOEMAL JUNIOR.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil HOEMAL JUNIOR untuk merawat aduan lain melainkan dibenarkan oleh doktor anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Paracetamol boleh menyebabkan alahan kulit yang teruk. Simptomnya termasuklah kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan serius. Jika tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Jika anda mempunyai masalah hati or ginjal, atau sedang menjalani terapi antikoagulan, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil HOEMAL JUNIOR.

Kesan-sesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, HOEMAL JUNIOR boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Sebarang kesan sampingan selalunya adalah ringan. Tindak balas hipersensitiviti kulit termasuk ruam kulit, angioedema (bengkak dan gatal-gatal kulit), Steven Johnson Syndrome / Toxic Epidermal Necrolysis (Melepuh kulit) telah dilaporkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety.*)

Cara penyimpanan dan pelupusan HOEMAL JUNIOR

Penyimpanan

Tutup dengan rapat dan betul. Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya terik. Jauhi daripada kanak-kanak.

Pelupusan

Lupuskan ubat selepas tarikh luppet. Sila dapatkan nasihat ahli farmasi tentang cara pelupusan sebarang ubat yang tidak digunakan lagi.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna HOEMAL JUNIOR

HOEMAL JUNIOR adalah cecair lutsinar likat berwarna merah dengan perisa strawberi. Boleh didapati dalam plastik botol 60ml.

Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan aktif:
Paracetamol 250mg/5ml

Bahan-bahan tidak aktif:
Methyl Paraben, Xanthan Gum, Hydroxythetylcellulose, Glycerin, Polysorbate 80, Sodium Citrate, Citric Acid Anhydrous, Ponceau 4R, Monoammonium Glycyrrhizinate, Sucralose, Strawberry flavor & Purified water.

Nombor MAL: MAL12015006XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Pengilang

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Tarikh kemaskini RiMUP

06/03/2017

Nombor siri

BPFK(R4/1)060317/00010