

DYNA CEPHALEXIN CAPSULE

Cephalexin Monohydrate (250 mg, 500 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dyna Cephalexin Capsule
2. Bagaimana Dyna Cephalexin Capsule berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dyna Cephalexin Capsule
4. Cara menggunakan Dyna Cephalexin Capsule
5. Semasa menggunakan Dyna Cephalexin Capsule
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna Cephalexin Capsule
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dyna Cephalexin Capsule

Dyna Cephalexin Capsule digunakan dalam rawatan jangkitan yang disebabkan oleh terdedah kepada mikroorganisma berikut:

- Jangkitan saluran pernafasan
- Otitis Media (jangkitan pada telinga)
- Jangkitan tulang
- Jangkitan saluran kencing, termasuk Prostat akut
- Jangkitan gigi

Bagaimana Dyna Cephalexin Capsule berfungsi

Cephalexin adalah sejenis pembunuhan bakteria dan bertindak sama seperti penisilin. Ia berfungsi dengan menghalang sintesis bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Dyna Cephalexin Capsule

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan Dyna Cephalexin Capsule pada pesakit yang diketahui alahan kepada kumpulan antibiotik Cephalosporin

Mengandung dan menyusukan anak
Jangan ambil Dyna Cephalexin Capsule jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil Dyna Cephalexin Capsule jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula mengambil Dyna Cephalexin Capsule

Beritahu doktor anda jika:

- Sebelum ini anda mempunyai tindak balas hipersensitiviti kepada cephalosporins dan Penicillin.
- Anda mempunyai porfiria (penyakit yang memberi kesan kepada sistem saraf) akut
- Anda mempunyai sejarah penyakit gastrousus.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Dyna Cephalexin Capsule

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: Dos dewasa adalah di antara 1-4 g setiap hari dalam dos yang sama dibahagikan.

Dos dewasa biasa: Oral, 250 - 500 mg setiap 6 jam.

Untuk jangkitan berikut, dos 500 mg boleh diberikan setiap 12 jam: streptococcal pharyngitis (jangkitan pada belakang tekak termasuk tonsil), jangkitan kulit dan struktur kulit dan cystitis (jangkitan saluran kencing) tidak rumit pada pesakit berumur lebih daripada 15 tahun.

Terapi Cystitis (jangkitan saluran kencing) perlu diteruskan selama 7 - 14 hari. Untuk jangkitan yang lebih teruk atau yang disebabkan oleh organisme kurang terdedah, dos yang lebih besar mungkin diperlukan.

Kanak-kanak: Dos harian yang biasa disyorkan adalah 25-50 mg / kg dalam dos dibahagikan.

Untuk sakit tekak pada kanak-kanak berumur lebih 1 tahun, jangkitan saluran kencing yang ringan, dan untuk jangkitan kulit dan struktur kulit, jumlah dos harian boleh dibahagikan dan diberikan setiap 12 jam. Dalam terapi otitis media, kajian klinikal telah menunjukkan bahawa dos 75 - 100 mg / kg / hari dalam 4 dos dibahagikan diperlukan. Dalam rawatan jangkitan B-hemolyticstreptococcal (jangkitan bakteria yang menyebabkan kemusuhan lengkap sel-sel darah merah (hemolisis)), dos terapeutik perlu diberikan sekurang-kurangnya 10 hari.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan loya, muntah-muntah, kesakitan atau rasa tidak selesa di bahagian atas abdomen, cirit-birit dan hematuria (kehadiran darah dalam air kencing).

Semasa menggunakan Dyna Cephalexin Capsule

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Dyna Cephalexin Capsule.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

DYNA CEPHALEXIN CAPSULE

Cephalexin Monohydrate (250 mg, 500 mg)

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Dyna Cephalexin Capsule dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Adalah disyorkan untuk kurangkan dos pada pesakit dengan kerosakan buah pinggang yang teruk.

Kesan-sesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Dyna Cephalexin Capsule boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan-sesan sampingan Dyna Cephalexin Capsule termasuk rasa loya, muntah-muntah, cirit-birit, *hypoprothrombinemia* (pendarahan yang luar biasa atau lebam), disfungsi buah pinggang (pengurangan dalam pengeluaran air kencing atau penurunan dalam tumpuan membuang air kencing) dan ketidakselesaan perut. Reaksi alahan seperti ruam kulit, urtikaria (ruam kulit yang gatal), *eosinophilia* (jumlah eosinophil, sel darah putih yang melawan penyakit yang luar biasa tinggi), *angioedema* (bengkak di bawah permukaan kulit), dan *anaphylaxis* (reaksi alahan teruk yang perlu dirawat segera) boleh berlaku, dan kenaikan dalam nilai enzim hati telah diperhatikan. *Neutropenia* (tahap sel darah putih yang luar biasa rendah) telah dilaporkan. Jangkitan kedua dengan mikroorganisma *resistant*, terutamanya Candida, mungkin berlaku selepas rawatan. Terdapat kemungkinan berlakunya pseudomembranous colitis (Bengkak atau radang usus besar (kolon) yang merupakan menyebabkan cirit-birit selepas penggunaan antibiotik).

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Public Reporting Medicinal Problems / Side Effects/AEFI/ Vaccine Safety*).

**Pengilang & Pemegang Pendaftaran
DYNAPHARM (M) SDN. BHD.**

2497, Mk. 1, Lorong Perusahaan Baru 5, Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600 Perai, Pulau Pinang, MALAYSIA

Tarikh kemaskini RiMUP

30/05/2017

**Cara penyimpanan dan pelupusan
Dyna Cephalexin Capsule**

- Penyimpanan

Jauhi dari kanak-kanak.

Pastikan bekas ditutup rapat.

Simpan di tempat yang kering di bawah 30°C.

Lindungi daripada cahaya.

Nombor Siri

BPFK(R4/1)26052017/00116

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Dyna Cephalexin Capsule 250mg

- Rupa dan warna produk

Kapsul gelatin keras bersaiz "1" dan berwarna merah/putih berisi granul putih

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Cephalexin Monohydrate

- Bahan tidak aktif

- Corn Starch, Lactose powder 200 mesh, Magnesium Stearate

Dyna Cephalexin Capsule 500mg

- Rupa dan warna produk

Kapsul gelatin keras bersaiz "0" dan berwarna merah/putih berisi granul putih

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Cephalexin Monohydrate

- Bahan tidak aktif

- Magnesium Stearate

- Nombor MAL

Dyna Cephalexin Capsule 250mg

MAL07050014AZ

Dyna Cephalexin Capsule 500mg

MAL07050015AZ