

PRIME ENEMA (ADULT)

Glycerin (50% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Prime Enema
2. Bagaimana Prime Enema berfungsi
3. Sebelum menggunakan Prime Enema
4. Cara menggunakan Prime Enema
5. Semasa menggunakan Prime Enema
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Prime Enema
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Prime Enema

Ia digunakan untuk melegakan keadaan sembelit.

Bagaimana Prime Enema berfungsi

Glycerin menggalakkan pergerakan usus dan pengosongan bahagian bawah usus dengan kesan iritasinya.

Sebelum menggunakan Prime Enema

- Bila tidak boleh mengguna

- jika ada alahan terhadap glycerin atau ramuan-ramuan lain produk.
- digunakan dengan berhati-hati jika anda mengalami dehidrasi.
- jangan gunakan produk ini semasa mengalami loya, muntah atau sakit abdomen kecuali atas arahan doktor.

- Sebelum mula mengguna

Sila beritahu doktor jika lau mengandung atau menyusukan anak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Ubat ini adalah untuk kegunaan luar sahaja, biasanya kurang mempengaruhi kesan ubat-ubat lain. Walau bagaimanapun, sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika lau mengambil ubat-ubat lain.

Cara menggunakan Prime Enema

- Berapa banyak harus diambil

Produk ini boleh digunakan pada kanak-kanak jika perlu. Kanak-kanak: 10ml enema bila perlu. Dewasa: 20ml enema bila perlu.

- Bila perlu diguna

Sila ikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Berapa lama perlu diguna

Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa mengguna

Guna sebaik sahaja teringat. Kemudian, guna seperti biasa.

- Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Jika terlebih dos, hubungi doktor, jabatan kecemasan atau pusat racun dengan segera.

Semasa menggunakan Prime Enema

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat sebaik sahaja berasa lega selepas beberapa hari, sambung sehingga jangka rawatan selesai.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Rawatan perlu dihentikan jika iritasi dan alahan serius berlaku. Jikalau hamil atau menyusukan anak, elak gunakan Prime Enema kecuali atas arahan doktor.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan biasanya adalah kesan dehidrasi glycerin. Glycerin juga menyebabkan iritasi apabila digunakan pada dubur.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel:03-78835550, atau laman web

npra.moh.gov.my (Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara penyimpanan dan pelupusan Prime Enema

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 25°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari kanak-kanak.

- Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Larutan tanpa warna.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: glycerin
- Bahan tidak aktif: benzalkonium chloride 80%, citric acid dan air.

- Nombor MAL:

MAL19912094X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

28/08/2017

Nombor siri

NPRA(R4/1)090817/00202