

# PRIVIN ENEMA

Glycerin/ Sodium Chloride (25% w/v / 15% w/v)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Privin Enema
2. Bagaimana Privin Enema berfungsi
3. Sebelum menggunakan Privin Enema
4. Cara menggunakan Privin Enema
5. Semasa menggunakan Privin Enema
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Privin Enema
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Privin Enema

Ia digunakan untuk melegakan keadaan sembelit.

## Bagaimana Privin Enema berfungsi

Glycerin menggalakkan pergerakan usus dan pengosongan bahagian bawah usus dengan kesan iritasinya.

## Sebelum menggunakan Privin Enema

### Bila tidak boleh menggunakan

- Jika ada alahan terhadap glycerin atau ramuan-ramuan lain produk.
- jangan guna produk ini bila anda muntah, loya atau sakit abdomen kecuali dengan arahan doktor.

### Sebelum mula menggunakan

Berhati-hati jika anda mengalami dehidrasi.

### Jika mengambil ubat-ubat lain

Ubat ini adalah untuk kegunaan luar sahaja, biasanya kurang mempengaruhi kesan ubat-ubat lain. Walau bagaimanapun, sila beritahu doktor atau ahli farmasi jikalau mengambil ubat-ubat lain.

## Cara menggunakan Privin Enema

### Berapa banyak harus diambil

Kanak-kanak: 10ml enema bila perlu.  
Dewasa: 20ml enema bila perlu.

### Bila perlu diguna

Sila ikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

### Berapa lama perlu diguna

Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

### Jika terlupa mengguna

Guna sebaik sahaja teringat. Kemudian, guna seperti biasa.

### Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Jika terlebih dos, hubungi doktor, jabatan kecemasan atau pusat racun dengan segera.

## Semasa menggunakan Privin Enema

### Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil.

### Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat sebaik sahaja berasa lega selepas beberapa hari, sambung sehingga jangka rawatan selesai.

### Perkara yang perlu diberi perhatian

Rawatan perlu dihentikan jika iritasi dan alahan serius berlaku. Jikalau hamil atau menyusukan anak, elak gunakan Prime Enema kecuali atas arahan doktor.

## Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan biasanya adalah kesan dehidrasi glycerin. Glycerin juga menyebabkan iritasi apabila digunakan pada dubur.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel:03-78835550, atau laman web

[npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) (Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

## Cara penyimpanan dan pelupusan Privin Enema

### Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya.  
Jauhkan dari kanak-kanak.

### Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

## Maklumat lanjut

### Rupa dan warna produk

Larutan jernih tanpa warna.

### Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: glycerin dan sodium chloride.
- Bahan tidak aktif: air.

### Nombor MAL:

MAL19962542X

## Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.  
1505, Lorong Perusahaan Utama 1  
Taman Perindustrian Bukit Tengah  
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,  
Malaysia.

## Tarikh kemaskini RiMUP

11/08/2017

## Nombor siri

NPRA(R4/1)100817/00205