

ORS PLUS SACHET

Dextrose Anhydrous/Sodium Citrate/Potassium Chloride/Sodium Chloride (3375mg/725mg/375mg/650mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ORS PLUS
2. Bagaimana ORS PLUS berfungsi
3. Sebelum mengambil ORS PLUS
4. Cara menggunakan ORS
5. Semasa menggunakan ORS PLUS
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan Pelupusan ORS PLUS
8. Maklumat lanjut ORS PLUS
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan ORS PLUS

ORS Plus mengandungi garam penting yang diperlukan oleh badan kita. Ia digunakan untuk menggantikan air dan elektrolit yang hilang semasa mengalami cirit birit yang sederhana sehingga teruk.

Bagaimana ORS PLUS berfungsi

Ubat ini berfungsi untuk menggantikan air dan garam-garam penting yang hilang daripada badan semasa cirit birit.

Sebelum mengambil ORS PLUS

Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan ubat ini jika anda menghidapi keadaan-keadaan berikut:

- Penyakit buah pinggang, hati atau jantung
- Paras potassium yang tinggi dalam badan
- Masalah dengan tahap garam dalam badan
- Kesukaran buang air
- Tekanan darah tinggi
- Edema (bengkak sebab retensi air)
- Muntah-muntah yang teruk
- Masalah dengan penggunaan produk yang mengandungi glukos

Hamil dan menyusukan bayi

Jangan ambil ORS PLUS jika anda hamil atau mungkin hamil.

Jangan ambil ORS PLUS jika anda sedang menyusukan bayi. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

-Sebelum mula mengambil

- Beritahu doktor atau ahli farmasi sekiranya anda ada alergi/alah terhadap sebarang ubat-ubatan.
- Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi ubat yang sedang anda ambil.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, kedai ubat atau mana-mana sumber lain.

Cara menggunakan ORS PLUS

Ambil ORS PLUS seperti yang telah diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Larutkan kandungan satu bungkus dalam 250ml air yang telah dimasak yang telah sejuk. Larutan ini perlu diminum.

Jangan didihkan larutan dan jangan gunakan kandungan dalam bungkus dalam sehiranya kelihatan lembap atau basah.

Gunakan larutan yang baru setiap hari. Buang baki larutan yang tidak digunakan setiap hari.

Bayi dan kanak-kanak kecil seharusnya diberikan larutan tersebut dengan perlahan-lahan di dalam jumlah yang sedikit, sekirap mungkin sepanjang 24 jam pertama cirit birit.

ORS Plus harus dilarutkan dengan air pada isipadu yang dinyatakan sahaja. Jangan lebihkan atau kurangkan kuantiti air yang diguna.

-Berapa banyak harus digunakan

Ikat arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Larutkan kandungan dalam setiap sachet 5.145g dalam 250mL air masak yang telah sejuk.

Bayi dan kanak-kanak seharusnya diberikan ORS PLUS ini dalam jumlah yang kecil, kerap dan perlahan-lahan sepanjang hari.

-Bila perlu digunakan

Iikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Mengambil terlalu banyak ORS PLUS boleh menyebabkan paras sodium dan potassium dalam darah menjadi sangat tinggi.

Pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat jika anda menganggap anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan ORS PLUS

-Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sehiranya simptom anda tidak berkurangan. Doktor anda akan memeriksa keadaan anda dan akan memberitahu sama ada anda perlu meneruskan pengambilan ubat ini atau tidak.

Sekiranya anda perlu mendapat rawatan lain, maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi bahawa anda sedang menggunakan ORS PLUS.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan berkongsi ORS PLUS dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

ORS PLUS SACHET

Dextrose Anhydrous/Sodium Citrate/Potassium Chloride/Sodium Chloride (3375mg/725mg/375mg/650mg)

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ORS Plus boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Walaubagaimana pun, skiranya anda mengalami apa-apa yang luar biasa, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Kesan sampingan yang dilaporkan termasuk Hypernatraemia, yang merupakan tahap sodium yang tinggi dalam darah.

Antara simptom hypernatraemia adalah termasuk kegelisahan, lemah, dahaga, lidah bengak, sakit kepala dan hipotensi.

Hyperkalaemia boleh berlaku selepas pengambilan yang berlebihan, selepas penggunaan potassium-sparing diuretics, kegagalan buah pinggang dan asidosis.

Antara simptom hyperkalaemia adalah termasuk kekeliruan mental, lemah, lumpuh, hipotensi, jantung tersumbat dan serangan jantung.

Kesan sampingan lain yang dilaporkan termasuk loya, muntah, cirit-birit dan kekejangan perut

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550 atau laman web npra.moh.gov.my (*Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan ORS PLUS

Penyimpanan

Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak.

Simpan ubat ini di tempat yang sejuk dan kering di mana suhunya sentiasa dibawah 30°C. Lindungi dari cahaya.

Jangan simpan ubat didalam bilik mandi, berdekatan dengan sinki atau tingkap.

Jangan meninggalkan ubat ini di dalam kereta semasa cuaca panas. Kepanasan dan kelembapan akan merosakkan sesetengah ubat.

Jangan ambil ubat ini sekiranya telah melewati tarikh tamat tempoh yang dicetak pada bungkusannya.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut ORS PLUS

-Rupa dan warna produk

Serbuk berwarna putih.

Bahan-bahan kandungan

ORS PLUS mengandungi:

- Bahan aktif Potassium chloride 375mg, Dextrose anhydrous 3375mg, Sodium chloride 650mg dan Sodium citrate 725mg.
- Bahan tidak aktif Orange Powder Flavour.

-Nomor MAL:

MAL19920360XZ

Pengilang:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad (60016-D),

11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad (60016-D),

11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP:

25/08/2017

Nombor siri

NPRA(R4/1)240817/00227