

# MICOZOL ORAL GEL

Miconazole nitrate (2% w/w)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Micozol
2. Bagaimana Micozol berfungsi
3. Sebelum menggunakan Micozol
4. Cara menggunakan Micozol
5. Semasa menggunakan Micozol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Micozol
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Micozol

Ia digunakan untuk merawat atau mencegah jangkitan kulat dalam mulut, kerongkong, perut atau usus.

## Bagaimana Micozol berfungsi

Micozol membunuh kulat yang menyebabkan jangkitan dan sesetengah bakteria pada tempat jangkitan.

## Sebelum menggunakan Micozol

### - Bila tidak boleh mengguna

- Jika ada
- alahan terhadap miconazole, atau ramuan-ramuan lain Micozol
  - masalah hati

### - Sebelum mula mengguna

- Berhati-hati apabila digunakan pada bayi dan kanak-kanak untuk mengelakkan daripada tercekik. Dos penggunaan harus terbahagi kepada amaun kecil.
- Keselamatan penggunaan semasa hamil atau menyusukan anak belum dipastikan lagi.
- Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil warfarin.

### - Jika mengambil ubat-ubat lain

Ubat-ubat ini perlu dimonitor:

- anticoagulants oral (mencegah bekuan darah)
- saquinavir, tacrolimus, cyclosporin dan sirolimus (untuk HIV)
- antikanser (busulfan, vinca alkaloids dan docetaxel, trimetrexate.)
- verapamil dan dihydropyridines (untuk penyakit tekanan darah tinggi)
- oral hypoglycemic (untuk penyakit kencing manis)
- phenytoin, carbamazepine (untuk sawan)
- buspirone, alprazolam, brotizolam, reboxetine (gangguan emosi)
- alfentanil (untuk sakit teruk)
- sildenafil (untuk impotens)
- rifabutin (antibiotik)
- methylprednisolone (steroid)

- ebastine (antihistamina)
- Ubat-ubat ini tidak harus diguna:
- simvastatin dan lovastatin (untuk kolesterol)
- terfenadine, astemizole, mizolastine (*antihistamine*)
- cisapride (untuk pergerakan gastrik)
- triazolam, midazolam (untuk kegelisahan)
- dofetilide (untuk denyutan jantung tak beritma)
- quinidine (untuk penyakit malaria)
- pimozide (untuk gangguan otak)

## Cara menggunakan Micozol

### - Berapa banyak harus diguna

Sapu bahagian berkenaan 4 kali sehari. Gel harus berada dalam mulut selama yang mungkin dan jangka rawatan perlu diteruskan untuk seminggu selepas tandatanda hilang. *Candidosis oral* – protestik gigi perlu dikeluarkan dan disapu dengan gel pada waktu malam.

### - Bila perlu diguna

Sila ikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

### - Berapa lama perlu diguna

Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

### - Jika terlupa mengguna

Guna sebaik sahaja teringat. Selepas itu, gunakan semula mengikut jadual biasa anda.

### - Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika terlebih dos, hubungi doktor, jabatan kecemasan atau pusat racun dengan segera.

Muntah dan cirit-birit mungkin berlaku.

## Semasa menggunakan Micozol

### - Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat sebaik sahaja berasa lega selepas beberapa hari, sambung sehingga jangka rawatan selesai.

### - Perkara yang perlu diberi perhatian

Jikalau hamil atau menyusukan anak, elak gunakan Micozol kecuali atas arahan doktor.

## Kesan-kesan sampingan

Iritasi setempat dan tindak balas sensitiviti akibat alergi mungkin berlaku. Gangguan ringan perut usus mungkin berlaku jika dimakan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel:03-78835550, atau laman web [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) (*Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

## Cara penyimpanan dan pelupusan Micozol

### - Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari kanak-kanak.

### - Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

## Maklumat lanjut

### - Rupa dan warna produk

Gel putih berperisa.

### - Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: miconazole nitrate
- Bahan tidak aktif: propylene glycol, polyethylene glycol, cremophor RH-40, methyl parabens, propyl parabens, polyvinylpyrrolidone, maltodextrin, sodium saccharin, silbione 70460, perisa buttermilk, sodium citrate, sodium chloride, gula dan air.

### - Nombor MAL:

MAL06011687AZ

## Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.  
1505, Lorong Perusahaan Utama 1  
Taman Perindustrian Bukit Tengah  
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,  
Malaysia.

## Tarikh kemaskini RiMUP

09/10/2017

## Nombor siri

NPRA(R4/1)051017/00265