

TARIVID OTIC SOLUTION

Ofloxacin (3mg/mL)

Apa yang ada dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan Tarivid Otic
2. Bagaimana Tarivid Otic berfungsi
3. Sebelum anda menggunakan Tarivid Otic
4. Cara menggunakan Tarivid Otic
5. Semasa anda menggunakannya
6. Kesan-kesan sampingan
7. Penyimpanan dan pelupusan Tarivid Otic
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Tarivid Otic

Tarivid Otic adalah agen antibakteria topikal yang digunakan untuk merawat jangkitan luar dan jangkitan telinga tengah.

Bagaimana Tarivid Otic berfungsi.

Tarivid Otic mengganggu enzim bakteria untuk mencegah pembiakan bakteria, seterusnya membunuh bakteria tersebut.

Sebelum anda menggunakan Tarivid Otic

- Bila tidak boleh menggunakan

Anda tidak boleh menggunakan Tarivid Otic jika anda mempunyai sejarah hipersensitiviti untuk ofloxacin.

Mengandung dan menyusukan anak
Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum menggunakannya

Sila gunakan Tarivid Otic pada suhu sama dengan suhu badan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Tarivid Otic

- Berapa banyak digunakan

Untuk orang dewasa, 6-10 titis Tarivid Otic harus diterapkan ke dalam telinga dijangkiti 2 kali sehari.

Bagi kanak-kanak, dos boleh dikurangkan.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Secara amnya, tempoh rawatan dengan ubat ini perlu 4 minggu.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat.

Jangan menggandakan dos

- Jika mengambil berlebihan

Hubungi doktor anda dengan segera

Semasa menggunakan Tarivid Otic

- Perkara yang perlu dilakukan

Ubat titis telinga harus dibenarkan untuk kekal di telinga selama 10 minit.

Anda perlu melengkapkan jangka penuh rawatan.

- Perkara yang tidak perlu dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat melainkan dinasihati oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Cara administrasi: Gunakan hanya untuk instilasi.

Jika ubat sejuk, anda mungkin berasa pening. Dengan demikian, gunakan ubat pada suhu yang sama dengan suhu tubuh.

Kesan-kesan sampingan

Kelemahan otot bertambah teruk
Tarivid Otic secara umumnya diterima baik. Sakit telinga mungkin berlaku jarang-jarang sekali.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web

npra.moh.gov.my (*Public* → *Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Tarivid Otic

- Penyimpanan

Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat atau dicapai oleh kanak-kanak.

Simpanan di bawah 30° C.

Kestabilan selepas pembukaan:

Produk ini mempamerkan kestabilan yang baik selama 4 bulan pada suhu bilik (25° C) apabila ia disimpan dalam sebuah beg plastik vinil pelindung cahaya selepas pembukaan.

- Pelupusan

Ubat ini tidak boleh dilupuskan melalui air sisa atau sampah-sarap. Minta ahli farmasi anda bagaimana untuk menjual ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair jernih berwarna kuning pucat atau kuning muda.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Ofloxacin

- Bahan tidak aktif

Benzalkonium klorida,

Sodium klorida

- Nombor MAL:

MAL20122266ACZ

Pengilang

Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Noto plant, 2-14, Shikinami, Hodatsushimizu-cho, Hakui-gun, Ishikawa, Jepun.

Pemegang pendaftaran produk

First Pharmaceutical Sdn Bhd
No. 20, Jalan SS 19/5
47500 Subang Jaya
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

22/2/2018

Nombor Siri

NPRA(R4/1)141217/00358