

REDAMOL TABLET

Paracetamol (500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Redamol Tablet
2. Bagaimana Redamol Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Redamol Tablet
4. Cara menggunakan Redamol Tablet
5. Semasa menggunakan Redamol Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Redamol Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Redamol Tablet

Redamol Tablet digunakan untuk melegakan kesakitan ringan ke sederhana dan untuk mengurangkan demam.

Bagaimana Redamol Tablet berfungsi

Paracetamol membantu melegakan kesakitan dengan menghalang pengutus kimia yang menyebabkan kesakitan dipanggil prostaglandin dalam sistem saraf pusat.

Sebelum mengambil Redamol Tablet

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil ubat ini jika:

- Anda mempunyai alahan/ alergi terhadap paracetamol atau bahan-bahan lain di dalam ubat ini.
- Anda mempunyai ketagihan alkohol.
- Anda menghidap penyakit hati.
- Anda menghidap jangkitan virus.
- Anda mengalami gangguan fungsi buah pinggang.
- Anda mempunyai penyakit jantung dan saluran darah.

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil mana-mana ubat.

-Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang atau pernah menghidap penyakit/ keadaan berikut:

- Hamil.
- Menyusukan anak.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan, ini termasuk ubat yang diperolehi tanpa preskripsi. Doktor anda mungkin perlu menukar dos ubat-ubat anda yang lain atau mengambil langkah berjaga-jaga yang lain. Dalam sesetengah kes, anda mungkin perlu menghentikan pengambilan salah satu ubat. Ini terutamanya kepada ubat-ubat yang disenaraikan di bawah yang diambil bersama-sama dengan Redamol Tablet:

- Paracetamol (Jangan ambil ubat-ubatan lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama).
- Cholestyramine (digunakan untuk menurunkan paras kolestrol di dalam darah).
- Metoclopramide atau Domperidone (digunakan untuk merawat loya dan muntah).
- Warfarin (antikoagulan yang digunakan untuk mencegah serangan jantung, strok dan darah beku).
- Chloramphenicol (antibiotik yang digunakan untuk rawatan jangkitan bakteria).
- Busulfan (ubat kanser).

Cara menggunakan Redamol Tablet

-Berapa banyak harus digunakan

Doktor atau ahli farmasi anda akan menasihati anda berapa dos yang perlu diambil setiap hari dan berapa lama anda perlu mengambilnya. Ini bergantung kepada keadaan anda dan sama ada anda mengambil sebarang ubat lain.

Dos yang dicadangkan adalah seperti berikut:

Dewasa: 1 – 2 tablet.

Kanak-kanak 7 hingga 12 tahun:

½ - 1 tablet.

Tidak disyorkan untuk kanak-kanak di bawah umur 6 tahun.

-Bila perlu digunakan

Untuk diambil 3 atau 4 kali sehari.

Doktor anda akan memberitahu sama ada ianya bersesuaian untuk anda

menggunakan Redamol Tablet mengikut jenis keadaan yang anda hidapi.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil Redamol Tablet selagi disyorkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda mengenai apa yang perlu dilakukan sekiranya anda terlupa mengambil dos anda. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan ambil ubat pada masa yang dijadualkan seterusnya. Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau dapatkan bantuan perubatan kecemasan di hospital terdekat jika anda fikir anda atau orang lain telah menggunakan terlalu banyak ubat ni walaupun tiada simptom keracunan atau rasa tidak selesa kerana anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Gejala-gejala terlebih dos Redamol Tablet termasuk cirit-birit, muntah atau loya, hilang selera makan, kekejangan atau sakit perut dan berpeluh luar biasa.

Semasa menggunakan Redamol Tablet

-Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda seperti yang diberitahu oleh doktor anda.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Redamol Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor.
- Jangan ambil ubat-ubatan baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

REDAMOL TABLET

Risalah Maklumat Ubat Untuk Pengguna (RiMUP)

Paracetamol (500mg)

- Jangan beri Redamol Tablet kepada orang lain walaupun mereka mempunyai gejala-gejala atau keadaan yang sama dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Penjagaan khas disyorkan semasa kehamilan. Hanya ambil ubat ini semasa mengandung jika disyorkan oleh doktor apabila faedah melebihi kemudaran pada bayi.
- Boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Perlu diberi secara berhati-hati kepada orang yang mengalami masalah buah pinggang atau hati.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Redamol Tablet juga mungkin mempunyai beberapa kesan sampingan yang tidak diinginkan walaupun tidak semua orang mendapatnya. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami kesan sampingan dibawah semasa mengambil ubat ini:

- Air kencing berdarah atau keruh.
- Kesukaran atau kesakitan membuang air kencing.
- Kekerapan keinginan untuk membuang air kencing.
- Penurunan jumlah air kencing.
- Lebam atau pendarahan luar biasa.
- Keletihan atau kelemahan luar biasa.
- Mata atau kulit kekuningan.
- Reaksi hipersensitiviti kulit termasuk ruam, bengkak bawah kulit, *Stevens Johnson Syndrome* atau *Toxic Epidermal Necrolysis*.
- Tindak balas kulit yang teruk. Gejala-gejala termasuk kulit kemerahan, lepuh atau ruam. Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan yang serius. Jika tindak balas ini berlaku, berhenti menggunakannya dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550 atau laman web

npra.moh.gov.my (*Public* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*)

Cara penyimpanan dan pelupusan Redamol Tablet

-Penyimpanan

Simpan di tempat yang kering di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

Jauhi ubat-ubatan daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet berwarna putih, berbentuk bulat, dengan diameter 12.7mm, bersisi serong, mempunyai garis lurus belahan di satu permukaan dan kosong di satu permukaan.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Paracetamol

- Bahan-bahan tidak aktif (dalam premix)

Pregelatinized starch, povidone dan stearic acid.

-Nombor MAL

MAL07091034XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Royce Pharma Manufacturing Sdn. Bhd.

PT 1663, Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

03/05/2018

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)100418/00102