

Sodium Fusidate (20 mg/g)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*
2. Bagaimana *Fucidin<sup>®</sup> Ointment* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*
4. Cara menggunakan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*
5. Semasa menggunakan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

## Apakah kegunaan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*

*Fucidin<sup>®</sup> Ointment* digunakan untuk merawat keadaan-keadaan di mana kulit dijangkiti oleh kuman (bakteria), seperti:

- Impetigo (satu tompokan kulit mengeluarkan air, berkerak dan bengkak)
- Dermatitis (keradangan kulit) dan tompok yang dijangkiti
- Luka yang dijangkiti
- Doktor anda mungkin memberikan ubat ini kepada anda atas sebab-sebab yang lain. Sila tanya doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda tidak pasti mengapa anda perlu mengambil *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*.

## Bagaimana *Fucidin<sup>®</sup> Ointment* berfungsi

*Fucidin<sup>®</sup> Ointment* mengandungi sodium fusidate. Ia adalah sejenis antibiotik.

*Fucidin<sup>®</sup> Ointment* berfungsi dengan membunuh kuman (bakteria) yang menyebabkan jangkitan.

## Sebelum menggunakan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*

- *Bila tidak boleh menggunakan*

Jangan gunakan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*;

- Jika anda mempunyai alahan (hipersensitif) terhadap *fusidic acid* atau *sodium fusidate*.

- Jika anda mempunyai alahan (hipersensitif) terhadap sebarang bahan lain dalam ubat anda. Anda boleh mendapatkan senarai bahan-bahan ini dalam seksyen 6: Kesan-kesan sampingan daripada risalah ini
- Jika anda mempunyai jangkitan yang disebabkan oleh organisma yang tidak terjejas oleh antibiotik

## Mengandung dan menyusukan anak

Sila tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum menggunakan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*:

- Jika anda hamil, atau berfikir anda hamil.
- Jika anda sedang menyusukan bayi.

## - Sebelum menggunakan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*

Berhati-hati dengan penggunaan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*

- Beri perhatian jika anda akan menggunakan ubat ini dekat mata anda atau mata kanak-kanak.

## - Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil sebarang ubat lain. Ini termasuk sebarang ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi.

*Fucidin<sup>®</sup> Ointment* adalah persediaan siap sedia untuk digunakan dan tidak patut dicampurkan dengan bahan kandungan atau persiapan lain

Maklumat penting tentang beberapa bahan-bahan daripada *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*

## ***Fucidin<sup>®</sup> Ointment* mengandungi:**

- Lemak wol. Ini boleh memberi anda ruam gatal dan keradangan pada kulit anda di mana ubat digunakan.
- Cetyl alkohol. Ini boleh memberi anda ruam gatal dan keradangan pada kulit anda di mana ubat digunakan.

Sila tanya doktor anda jika anda bimbang tentang sebarang bahan kandungan dalam ubat ini.

## Cara menggunakan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*

Ubat ini adalah hanya untuk penggunaan pada kulit anda. Jangan telannya. Jangan letakkan ia di dalam badan anda.

Alihkan penutupnya. Pastikan meterai itu tidak dipecahkan sebelum anda mula menggunakan salap. Kemudian tolak kenaikan dalam topi melalui meterai pada tiub.

Basuh tangan anda sebelum menggunakan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*. Sapukan ubat perlahan-lahan pada kulit. Jika anda menggunakannya pada muka anda,berhati-hati untuk mengelakkan mata anda.

Melainkan anda menggunakan salap untuk merawat tangan anda, sentiasa basuh tangan anda selepas menggunakan *Fucidin<sup>®</sup> Ointment*.

Jika anda secara tidak sengaja mendapat ubat dalam mata anda, basuhkan ia dengan air sejuk dengan segera. Kemudian basuh mata anda dengan pencuci mata jika boleh. Mata anda mungkin berasa pedih. Jika anda mula mempunyai masalah dengan penglihatan anda atau mata anda sakit, hubungi doktor anda dengan segera.

## - Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan memberitahu anda berapa banyak *Fucidin<sup>®</sup> Ointment* untuk digunakan.

## - Bila perlu digunakan

Biasanya, anda perlu menggunakan ubat ini dua hingga tiga kali setiap hari.

## - Berapa lama perlu digunakan

*Fucidin<sup>®</sup> Ointment* digunakan untuk kawasan terjejas biasanya selama 7 hari.

- Jika terlupa menggunakan

- Jika anda terlupa untuk menggunakan ubat ini, gunakannya sebaik sahaja anda ingat. Kemudian teruskan menggunakan ubat ini pada masa yang biasa.
- Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut mengenai penggunaan ubat ini, sila tanya doktor atau ahli farmasi.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak krim atau sedikit krim ditelan secara tidak sengaja, ia tidak akan menyebabkan apa-apa kemudaratan. Jika banyak krim ditelan secara tidak sengaja atau anda bimbang, hubungi doktor anda, ahli farmasi atau Jabatan Kemasukan dan Kecemasan untuk mendapatkan nasihat.

**Semasa menggunakan *Fucidin*<sup>®</sup> Ointment**

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Fucidin*<sup>®</sup> Ointment

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi *Fucidin*<sup>®</sup> Ointment dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

*Memandu dan menggunakan jentera*

Biasanya ubat anda akan mempunyai kesan yang sangat sedikit terhadap keupayaan untuk memandu atau menggunakan mesin. Bincang dengan doktor anda jika anda berasa sebarang kesan sampingan yang mungkin menghalang anda daripada memandu atau menggunakan mesin

**Kesan-kesan sampingan**

Seperti semua ubat-ubatan, *Fucidin*<sup>®</sup> Ointment boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan penting untuk diperhatikan:

Jarang (mungkin memberi kesan kurang daripada 1 dalam 1000 orang)

Anda perlu mendapatkan bantuan perubatan segera jika anda mempunyai sebarang simptom berikut. Anda mungkin mengalami reaksi alahan:

- Anda mempunyai kesukaran bernafas
- Muka atau tekak anda bengkak
- Kulit anda mempunyai ruam yang teruk.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius atau anda notis apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, beritahu doktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) (Public→Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI)

**Cara penyimpanan dan pelupusan**

*Fucidin*<sup>®</sup> Ointment

- Penyimpanan

- Jangan simpan pada suhu melebihi 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

**Maklumat lanjut**

- Rupa dan warna produk

*Fucidin*<sup>®</sup> Ointment adalah salap yang berwarna hampir putih. *Fucidin*<sup>®</sup> Ointment didapati dalam tiub 5g dan 15g.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
  - Sodium fusidate (20mg/g)
- Bahan tidak aktif
  - Cetyl alkohol
  - Lemak wol
  - Parafin cecair
  - Parafin lembut putih

- Nombor MAL

MAL19910820AZ

**Pengilang**

LEO Laboratories Ltd  
285, Cashel Road, Crumlin,  
Dublin 12, Ireland

**Pemegang Pendaftaran Produk**

DKSH Malaysia Sdn Bhd  
B-11-01, The Ascent, Paradigm  
No.1, Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya  
Petaling Jaya Selangor.

**Tarikh kemaskini RiMUP**

23/02/2017

**Nombor Siri**

NPRA (R1/1) 150217 / 003.